

Ancien N° régional :

COLLINES SABLEUSES DU TRICASTIN ET PLAINE D'AVRIL

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 442 ha

Drôme

LA BAUME-DE-TRANSIT, SAINT-RESTITUT, SOLERIEUX, SUZE-LA-ROUSSE,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

26200001, 26200002

Description et intérêt du site

Entre vallée du Rhône et Baronnies, aux portes de la Provence, le Tricastin constitue un ensemble naturel très original. Portant l'empreinte d'une agriculture méditerranéennes (vigne, primeurs, cultures aromatiques, plantations de chênes truffiers), il présente un relief atténué lié à la prédominance des roches tendres d'âge tertiaire : molasses gréseuses, mais aussi sables.

Il abritait dans le passé de nombreuses zones humides souvent étendues, encore décelables à travers la toponymie ("Grand Etang", "Palud" et autres "Grenouillères"), mais qui ont quasiment toutes été drainées et mises en culture à partir du XVII^{ème} siècle.

Ses atouts naturalistes demeurent considérables compte tenu de l'extension des pelouses ou garrigues méditerranéennes sur substrat très sec, mais aussi de la persistance aux côtés de celles-ci de quelques zones humides abritant une diversité très élevée d'amphibiens et de reptiles, au sein de paysages agricoles très diversifiés ayant permis le maintien d'une faune et d'une flore de grand intérêt.

La zone délimitée circonscrit un ensemble particulièrement remarquable, autour de deux ensembles juxtaposés mais très contrastés : la Plaine d'Avril et le massif sableux qui la jouxte au nord du bourg de Suze-la-Rousse.

La Plaine d'Avril (dont l'aspect actuel résulte de la mise en valeur agricole d'une vaste zone humide), conserve un paysage très diversifié, entrecoupé de canaux et de friches sableuses ; elle présente en particulier un grand intérêt ornithologique, mais aussi botanique.

Les milieux secs (sur sables, grès calcaires ou calcaires) dominent au sein du massif qui la surplombe ; ce dernier n'en recèle pourtant pas moins une zone humide rélictuelle, particulièrement précieuse dans ce contexte méditerranéen : l'Etang Saint Louis.

L'ensemble se distingue tout à la fois :

- par la présence de types d'habitats naturels de grand intérêt, souvent très rares dans la région compte-tenu de leurs exigences climatique ou édaphique particulières : pelouses et groupements de plantes annuelles sur sables calcaires, cladiaie (formation végétale humide dominée par le Marisque), fourrés méditerranéens,

- par la flore qui leur est associée. Parmi celle-ci, on observe de nombreuses espèces parvenant ici en limite septentrionale ou au contraire méridionale de leur aire de répartition, comme la Silène de Porto ou l'Ecuelle d'eau, voire inféodées à certains types de substrats sableux (Loeflingie d'Espagne, Soude, Bassie à fleurs laineuses...) ou humides (Samole de Valerand).

La faune n'est pas en reste, en ce qui concerne les oiseaux peuplant la Plaine d'Avril (Oedicnème criard, Cochevis huppé...) ou les abords de l'Etang Saint Louis, les insectes (papillon Proserpine, libellules), mais surtout les amphibiens et reptiles, particulièrement bien représentés (Pélobate cultripède, Rainette méridionale, Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier...) ainsi que les chauve-souris avec la colonie du tunnel de drainage du Château de la Borie, qui présente un intérêt de niveau international pour le Minioptère de Scheribers, mais aussi le Grand et le Petit Murins.

Le zonage de type II délimite ce complexe écologique, au sein duquel deux secteurs relativement bien connus en matière naturaliste sont délimités en zones de type I. Il souligne la présence probable d'habitats naturels ou d'espèces remarquables en dehors de ces deux secteurs, qui mériterait d'être précisée à l'occasion d'inventaires complémentaires (cas de la Plaine d'Avril).

Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables notamment parmi les oiseaux, les insectes ou les chiroptères.

L'ensemble présente en outre un grand intérêt géologique, géomorphologique et paysager.

Milieux naturels

32.342	MAQUIS A CISTUS SALVIIFOLIUS
34.12	PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.4	PRAIRIES HUMIDES MEDITERRANEENNES A GRANDES HERBES
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Flore

Achillée tomenteuse	Achillea tomentosa L.
Orcanette des teinturiers	Alkanna tinctoria Tausch «(L.) Tausch»
Orchis à longues bractées	Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Kochia à fleurs laineuses	Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott.
Micropus dressé	Bombycilaena erecta
Laïche à longues bractées	Carex distachya Desf.
Ciste à feuilles de sauge	Cistus salviifolius L.
Dorycnium dressé	Dorycnium rectum (L.) Ser.
Euphorbe de Nice	Euphorbia nicaeensis All.
Globulaire allongée	Globularia vulgaris L.
Ecuelle d'eau	Hydrocotyle vulgaris L.
Ibérís penné	Iberis pinnata L.
Iris nain	Iris lutescens Lam.
Gesse de Nissole	Lathyrus nissolia L.
Loeflingie d'Espagne	Loeflingia hispanica L.
Nénuphar jaune	Nuphar lutea (L.) Sm.
Bugrane à fleurs pendantes	Ononis reclinata L.
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	Ophioglossum vulgatum L.
Fléole des sables	Phleum arenarium L.
Plantain sp.	Plantago holosteum Scop.
Rosier sempervirent	Rosa sempervirens L.
Soude brûlée	Salsola kali L.
Samole de Valerand	Samolus valerandi L.
Séneçon doria	Senecio doria L.
Silène conique	Silene conica L.
Silène à petites fleurs	Silene otites (L.) Wibel
Fougère des marais	Thelypteris palustris Schott
Tribule terrestre	Tribulus terrestris L.
Utriculaire commune	Utricularia vulgaris L.
Molène de Chaix	Verbascum chaixii Vill.
Dompte-venin noir	Vincetoxicum nigrum
Hélianthème taché	Xolantha guttata (L.) Rafin.

Faune vertébrée

Amphibien	
Crapaud calamite	Bufo calamita
Rainette méridionale	Hyla meridionalis
Pélobate cultripède	Pelobate cultripes
Pélodyte ponctué	Pelodytes punctatus
Mammifère	
Campagnol amphibie	Arvicola sapidus
Minioptère de Schreibers	Miniopterus schreibersi
Petit murin	Myotis blythi
Grand murin	Myotis myotis

Oiseau	
Rousserolle turdoïde	Acrocephalus arundinaceus
Hibou moyen-duc	Asio otus
Engoulevent d'Europe	Caprimulgus europaeus
Bouscarle de Cetti	Cettia cetti
Cisticole des joncs	Cisticola juncidis
Bruant des roseaux	Emberiza schoeniclus
Bécassine des marais	Gallinago gallinago
Alouette lulu	Lullula arborea
Guêpier d'Europe	Merops apiaster

Reptile	
Orvet fragile	Anguis fragilis
Lézard ocellé	Lacerta lepida
Couleuvre de Montpellier	Malpolon monspessulanus
Psammodrome d'Espagne	Psammodromus hispanicus

Faune invertébrée

Libellule	
Aeschne printanière	Brachytron pratense
Agrion de Mercure	Coenagrion mercuriale
Agrion mignon	Coenagrion scitulum
Sympetrum piémont	Sympetrum pedemontanum
Papillon	
Proserpine	Zerynthia rumina

Bibliographie

Pas de donnée disponible

