



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000053

Ancien N° régional :

Forêt de Lioutarday

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 50,99 ha

Isère

GRESSE-EN-VERCORS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 1

Description et intérêt du site

La puissante muraille calcaire qui se déploie sur les bordures méridionales, orientales et septentrionales du Vercors, confère à ce massif un intérêt international tant des points de vue géomorphologique, paysager, que biologique. Le Vercors est le plus grand massif des Préalpes calcaires ; un cinquième de sa surface est occupé par la plaque calcaire (de faciès géologique urgonien) des hauts plateaux. Ce plateau karstique est un site de référence en matière d'étude du karst. La végétation n'est pas moins remarquable avec la présence de nombreux habitats naturels de pelouses, de falaises calcaires, de groupements forestiers et d'éboulis secs méridionaux abritant de nombreuses espèces végétales, parfois endémiques (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique restreinte). La forêt de Lioutarday abrite une espèce botanique emblématique qui contribue à son intérêt naturaliste. Le Sabot de Vénus est encore appelé "Pantoufle de Notre-Dame" du fait de la forme de sa fleur. Représentant la plus célèbre des orchidées de la flore européenne, c'est une espèce rare, tant par le nombre de populations que par celui des individus : le risque de son extinction est donc réel... La pollinisation en est effectuée par des Hyménoptères (insectes apparentés aux mouches) pénétrant par l'orifice principal du labelle. Lors de leur sortie, ils entrent en contact avec l'une ou l'autre des étamines et transportent ainsi le pollen. Sur le même trajet (en général dans une autre fleur) ils déposent le pollen sur les stigmates.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Sabot de Vénus *Cypripedium calceolus L.*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


MARY E.
Cartographie et typologie des habitats naturels du bassin de Château-Bernard et Saint-Andéol (Parc naturel régional du Vercors)
71 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Environnement
et du Territoire
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38000053



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)