



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000095

Ancien N° régional : 38000800

Montagne d'Uriol

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 035,68 ha

Isère

LE GUA, SAINT-PAUL-DE-VARCES, VARCES-ALLIERES-ET-RISSET, VIF

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 52

Description et intérêt du site

La puissante muraille calcaire qui se déploie sur les bordures méridionales, orientales et septentrionales du Vercors, confère à ce massif un intérêt international tant des points de vue géomorphologique, paysager, que biologique. La forêt trouve dans le massif du Vercors des conditions optimales, ce qui place cette région parmi les plus boisées de France. Sur la montagne d'Uriol, la forêt et les milieux associés (landes et rochers) abritent des espèces très intéressantes. L'Engoulevent d'Europe se rencontre préférentiellement dans les landes bien exposées. Cet oiseau, invisible pendant la journée, peut être entendu au crépuscule. Il est présent, en France, d'avril à septembre, et hiverne au sud du Sahara. Plus fréquent dans le sud de l'hexagone, il se reproduit sporadiquement sur l'ensemble du territoire et pond ses œufs à même le sol sur un tapis de feuilles mortes. La Pie-grièche écorcheur affectionne les espaces ouverts parsemés de buissons et fourrés. D'un perchoir dégagé, elle s'envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau migrateur n'est présent dans nos contrées que de mai à septembre. Le Grand-duc d'Europe est le plus grand rapace nocturne d'Europe avec une envergure de 1,6 à 1,9 m. C'est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et arrondies et une grosse tête surmontée de deux aigrettes. Pendant le jour, il se tient caché sur les rochers grâce à son plumage d'une couleur fauve discrète. Même si ses effectifs sont en augmentation depuis une trentaine d'années, ce rapace reste assez rare puisque l'on estime la population nicheuse inférieure à 1500 couples pour toute la France. En matière de flore, l'Orchis pâle est une orchidée montagnarde de mi-ombre. On peut aussi mentionner la présence de l'Inule variable, de la Fraxinelle blanche et de l'Asaret d'Europe.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Sérotine bicolore *Vespertilio murinus*

Oiseaux

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*
Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*
Faucon pèlerin *Falco peregrinus*
Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Flore


Aconit anthora	<i>Aconitum anthora L.</i>
Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile (L.) R. Br.</i>
Guimauve hérissée	<i>Althaea hirsuta L.</i>
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata Lam.</i>
Arabette scabra	<i>Arabis scabra All.</i>
Cytise argenté	<i>Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball</i>
Armoise blanche	<i>Artemisia alba</i>
Asaret d'Europe	<i>Asarum europaeum L.</i>
Asperge à feuilles étroites	<i>Asparagus tenuifolius Lam.</i>
Rapette couchée	<i>Asperugo procumbens L.</i>
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Brome raboteux	<i>Bromus squarrosus L.</i>
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>
Campanule carillon	<i>Campanula medium L.</i>
Cléistogènes tardif	<i>Cleistogenes serotina (L.) Keng</i>
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris Cass.</i>
Fraxinelle blanche	<i>Dictamnus albus L.</i>
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri Godfery</i>
Dent de chien	<i>Erythronium dens-canis L.</i>
Gagée jaune	<i>Gagea lutea (L.) Ker-Gawler</i>
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel</i>
Hysop officinal	<i>Hyssopus officinalis L.</i>
Inule variable	<i>Inula bifrons (L.) L.</i>
Jasmin buissonnant	<i>Jasminum fruticans L.</i>
Liondent crépu	<i>Leontodon crispus Vill.</i>
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum (L.) Swartz</i>
Lin bisannuel	<i>Linum bienne Miller</i>
Mélilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus Ten.</i>
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera Hudson</i>
Orchis pâle	<i>Orchis pallens L.</i>
Orobanche de l'armoise des champs	<i>Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex Gaudin</i>
Osyris blanc (Rouvet)	<i>Osyris alba L.</i>
Pistachier térébinthe	<i>Pistacia terebinthus L.</i>
Polypode du Pays de Galles	<i>Polypodium cambricum L.</i>
Scorzonère d'Autriche	<i>Scorzonera austriaca Willd.</i>
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme (Jacq.) Pau</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata L.</i>
Isopyre faux pigamon	<i>Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi</i>
Thésium à feuilles de lin	<i>Thesium linophyllum L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie


Pas de données disponibles



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1




Légende

 Périimètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy