



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38000107

Ancien N° régional :

## Coteau boisé des Gorges du loup

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 49,04 ha

Isère BEAUFIN

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante  
1 = prospection insuffisante  
2 = prospection assez bonne  
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 19

### Description et intérêt du site

Dominant le Drac, le coteau des Gorges du Loup abrite une papilionacée très rare, dont la répartition géographique est très sporadique. Elle n'a d'ailleurs été identifiée dans les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes qu'en 1994 : il s'agit de la Vesce à feuilles de pois. Cette plante affectionne les lisières en exposition chaude. On rencontre aussi ici l'Apollon. Ce beau papillon est surtout présent dans les lieux ensoleillés rocaillieux où poussent des plantes grasses comme les orpins ou les jubarbes, nourriture principale de la chenille. A basse altitude, l'urbanisation et l'agriculture font diminuer ses aires de vol. Les berges du Drac, quant à elles, sont favorables à un autre papillon rare : le Damier de la Succise. Il fréquente les prairies humides et les tourbières où sa chenille se nourrit d'une plante particulière : la Succise des prés. La destruction des zones humides par assèchement et mise en culture met en péril les populations de cet insecte dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des espèces.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Armoise blanche	<i>Artemisia alba</i>
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>
Centranthe à feuilles étroites	<i>Centranthus angustifolius (Miller) DC.</i>
Gesse noircissante	<i>Lathyrus niger (L.) Bernh.</i>
Gesse à graines sphériques	<i>Lathyrus sphaericus Retz.</i>
Mélilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus Ten.</i>
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha Swartz</i>
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme (Jacq.) Pau</i>
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata L.</i>
Vesce fausse esparcette	<i>Vicia onobrychioides L.</i>
Vesce à feuilles de pois	<i>Vicia pisiformis L.</i>

## Faune invertébrée

### Papillons

Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>

## Bibliographie

### BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### LAFRANCHIS J.


Le Damier de la Succise

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

### LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

