



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38020119

Ancien N° régional : 38242403

Pelouses de St Baudille de la Tour

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 40,06 ha

Isère

SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 20

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un ensemble de plusieurs pelouses sèches, dont la présence ici est à mettre en relation avec des facteurs stationnels tels que la topographie, l'exposition, l'humidité du sol, le ruissellement, l'infiltration, la nature du sol et des matériaux. De plus, l'Isle Crémieu joue un rôle de "carrefour biogéographique", combinant les influences méditerranéenne et médio-européenne. Ces facteurs contribuent, de même que des pratiques agricoles longtemps restées traditionnelles, à la grande richesse écologique et biologique des pelouses locales. Ainsi, ces pelouses illustrent plusieurs types d'habitats naturels importants à conserver, et possèdent une flore riche en espèces remarquables comme la Pulsatille rouge, l'Ail joli ou l'Orchis à odeur de vanille (espèce protégée en France). Leur cortège faunistique est également très diversifié et parfois rare. De plus, les pelouses sèches présentent un intérêt paysager indéniable en contribuant, entre autres, à maintenir des espaces ouverts autour des villages.

Milieus naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Faune vertébrée

Oiseaux	
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>

Flore

Ail joli	<i>Allium carinatum subsp. pulchellum</i> Bonnier & Layens
Orchis à odeur de vanille	<i>Orchis coriophora subsp. fragrans</i> (Pollini) K. Richter [1890]
Pulsatille rouge	<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Autoroute A48 Ambérieu - Bourgoin. Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 8201727 des "Etangs, coteaux secs et grottes de l'Isle Crémieu"
pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes


Suivi des populations de Cistude d'Europe (*Emys orbicularis*) de l'Isle Crémieu. Première phase : 1999
25 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38020119



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)