

ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LA VAREZE ET SES AFFLUENTS

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 375 ha

Isère

ASSIEU, AUBERIVES-SUR-VAREZE, BOSSIEU, CHEYSSIEU, CLONAS-SUR-VAREZE, LES COTES-D'AREY, COUR-ET-BUIS, MEYSSIES, MONSTEROUX-MILIEU, MONTSEVEROUX, SAINT-ALBAN-DU-RHONE, SAINT-CLAIR-DU-RHONE, SAINT-JULIEN-DE-L'HERMS, SAINT-PRIM, VERNIOZ, VILLENEUVE-DE-MARC,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

38110001, 38110002

Description et intérêt du site

Cette zone intègre l'ensemble fonctionnel formé par la Varèze et ses affluents. Celle-ci s'écoule dans une vallée relativement étroite jusqu'à sa confluence avec le Rhône.

Elle présente un intérêt naturaliste manifeste, sur le plan botanique (Petite Scutellaire), au regard de la population de Castor d'Europe présente localement, mais surtout en raison de son entomofaune (très riche en ce qui concerne les libellules) et du maintien d'un patrimoine piscicole de qualité (Chabot, Toxostome...).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, le cours de la Varèze proprement-dit étant notamment retranscrit par le zonage de type I. Il traduit la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées) en tant que zone d'alimentation ou de reproduction, mais aussi que corridor biologique mettant en relation la vallée du Rhône et les secteurs naturels des Terres Froides (en particulier la forêt de Bonnevaux).

L'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des crues) et de protection de la ressource en eau.

Milieux naturels

Pas de donnée disponible

Flore

Petite Scutellaire

Scutellaria minor Hudson

Faune vertébrée

Amphibien

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Mammifère

Castor d'Europe

Castor fiber

Putois

Mustela putorius

Oiseau

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Poisson

Toxostome

Chondrostoma toxostoma

Chabot

Cottus gobio

Bouvière

Rhodeus sericeus

Reptile

Couleuvre d'Esculape

Elaphe longissima

Faune invertébrée

Libellule

Aeschna paisible

Boyeria irene

Calopteryx méditerranéenne

Calopteryx xanthostoma

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Gomphus très commun

Gomphus vulgatissimus

Leste dryade

Lestes dryas

Gomphus à pinces

Onychogomphus forcipatus

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisi

Sympetrum jaune

Sympetrum flaveolum

Papillon

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Bibliographie

GALET C.


Étude préliminaire à la protection du sonneur à ventre jaune (Bombina variegata L.) dans les forêts publiques du Bas Dauphiné

1998 pages : 30 p. Consultable : AVENIR

MERLE,H.


Inventaire des milieux naturels et de la flore du territoire du Syndicat mixte Bièvre-Valloire

2004 pages : 5p.+a Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1

