



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38140002

Ancien N° régional : 38533403,38533402

Marais de Bavonne

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 15,83 ha

Isère

CHIRENS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

Cette tourbière alcaline est alimentée par un ruisseau adjacent, dont elle contribue à régulariser le débit. Il s'agit d'une tourbière alcaline ; celles-ci se développent sur des sols riches en calcaire. Elles sont également appelées "tourbières plates" ou "tourbières basses". La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laîches mais aussi de mousses particulières : les hypnacees. Essentiellement développées dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante, elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. Ce sont essentiellement des tourbières de plaine. Les milieux naturels associés aux tourbières alcalines sont très variés. Il s'agit le plus souvent de prairies à forte diversité floristique. La végétation du marais de Bavonne est composée de secteurs en cours d'enrichissement, de roselières ouvertes et de prairies humides. Ces prairies à forte diversité floristique accueillent notamment le Liparis de Loesel. Cette petite orchidée est menacée à court terme par la fermeture de son milieu. L'abandon des pratiques agricoles ancestrales (fauche, pâturage) en est la principale cause. De même, la faune des tourbières alcalines est assez riche. Elle comporte notamment plusieurs espèces de papillons en forte régression. Le Cuivré des marais, par exemple, trouve sur le marais de Bavonne un milieu encore favorable.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata Schumacher</i>
Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus L.</i>
Epipactis des marais	<i>Epipactis palustris (L.) Crantz</i>
Liparis de Loesel	<i>Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>

Faune invertébrée

Papillons

Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>
-------------------	-----------------------

Bibliographie

AVENIR
Notice de préconisation de gestion du marais de Bavonne (commune de Chirens)
13 pages 2003 Consultable : AVENIR


MERLE H.
Cartographie des habitats. Site I06 - Val d'Ainan
1p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
N° 38140002

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38140002



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)