



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38160009

Ancien N° régional : 38743612,38743616

Marais de l'Echailon et bords de l'Isère jusqu'au bec de l'Echailon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 296,26 ha

Isère

MOIRANS, SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE, TULLINS, VOREPPE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
Végétaux sucoérieurs	1	Mammifères	1	Crustacés		Libellules	0
Mousses, lichens		Oiseaux	1	Mollusques		Orthoptères	0
		Poissons	0			Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 12

Description et intérêt du site

Les forêts alluviales sont des milieux naturels en régression constante en France sous l'effet de divers aménagements. Le long de l'Isère, en amont de la cluse de Voreppe, la zone considérée présente une profusion d'essences forestières, ainsi qu'une végétation pionnière colonisant les bancs de sable, témoin de la dynamique de végétation du bord des eaux. Le site présente un intérêt important aussi bien pour les oiseaux en migration (Rémiz penduline en particulier) que pour l'avifaune nicheuse typique des bords de l'Isère. Celle-ci est représentée notamment par le Martin-pêcheur d'Europe. Parmi les plantes emblématiques du site, on remarque la présence de l'Utriculaire commune. Les feuilles en lanières de cette plante carnivore portent de petites outres, appelées utricules, capables de capturer de petits animaux. Entièrement immergée, l'Utriculaire commune passe inaperçue une grande partie de l'année. Elle se remarque en été par la présence de petites fleurs jaune vif qui apparaissent à la surface de l'eau.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>

Flore

Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi L.</i>
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis R. Br.</i>
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.


Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy