



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38210025

Ancien N° régional : 38040010

Col des Mouilles

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 54,31 ha

Isère

LAVAL, SAINTE-AGNES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 21

Description et intérêt du site

Le site est formé de deux zones humides principales, ainsi que de petits secteurs à sphaignes dispersés dans la forêt ; Il est menacé par l'enfrichement et localement par le drainage. Ces milieux naturels originaux abritent une flore remarquable. L'Orchis de Traunsteiner est protégée en raison de la régression des milieux qui l'abritent. Moins de quarante stations de cette plante sont dénombrées dans le département de l'Isère (dont près d'un tiers se situent entre 1800 et 2000 m d'altitude), dans les massifs de Belledonne et des Grandes-Rouses, dans le Haut-Grésivaudan et ça et là dans le Vercors, en Chartreuse et en Oisans. Ses stations, jamais très abondantes, se situent essentiellement dans les marais et les prairies détrempées (Servier, Henniker-1995). Le Rossolis à feuilles longues, une plante carnivore, est beaucoup plus rare que son cousin le Rossolis à feuilles rondes ; il est menacé dans la plupart de ses stations, et n'est plus connu que dans moins de dix localités du département. Le Rhynchospora blanc, une herbacée discrète, est quant à lui identifié dans trois stations en Isère seulement ; il est globalement rare en France, même s'il paraît mieux représenté en Haute-Savoie. Tout aussi effacé mais coiffé de fines soies blanches, le Scirpe de Hudson n'est pas plus courant, loin s'en faut : deux stations seulement en Isère. Il s'agit là encore d'une espèce rare, localisée en France aux étages montagnards à alpins du Massif central, du Jura et des Alpes. En ce qui concerne les oiseaux, le col des Mouilles est un site de passage migratoire. On y note, par ailleurs, la présence d'espèces forestières montagnardes caractéristiques.

Milieux naturels

44.A4	BOIS D'EPICEAS A SPHAGNES
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Rossolis à feuilles longues	<i>Drosera longifolia L.</i>
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia L.</i>
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia L.</i>
Rhynchospora blanc	<i>Rhynchospora alba (L.) Vahl</i>
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

AVENIR

Notice de préconisation de gestion des tourbières du Col des Mouilles sur les communes de Sainte Agnès et Laval


11 pages2001Consultable : AVENIR



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Environnement
et du Climat

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38210025



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)