



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38230005

Ancien N° régional : 26000100,38024707,26000200

Montagne de Beure

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 674,29 ha

Drôme CHAMALOC, ROMEYER, SAINT-AGNAN-EN-VERCORS, VASSIEUX-EN-VERCORS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 75

Description et intérêt du site

Coincée entre la montagne de Nève, à l'ouest, et les contreforts des hauts plateaux à l'est, la montagne de Beure présente un relief globalement peu accusé. Des résurgences issues des hauts plateaux alimentent le ruisseau de la combe mâle, ruisseau qui se jette en aval de la montagne de Beure dans la Vernaison. En amont de la vallée qui voit naître les eaux de cette dernière se trouve le col du Rousset. Il marque la ligne de partage entre Alpes du nord et Alpes du sud. Le contraste, de part et d'autre de cette limite climatique, est surprenant : d'un côté, une flore à affinité méditerranéenne, de l'autre, une végétation plus septentrionale. La montagne de Beure est recouverte de forêts montagnardes de Hêtre (ou Fayard) et de Sapin pectiné. Le Sabot de Vénus est particulièrement bien représenté dans ces milieux. La Gélinotte des bois y est, aussi, présente. Le Cassenoix moucheté fait son nid dans les branches des conifères. Pendant la belle saison, il récolte les faines des hêtres et les glands des chênes, qu'il cache dans le sol et les racines des arbres. En hiver, le Cassenoix moucheté creuse un tunnel dans la neige pour y retrouver ses réserves. Le Tétraz lyre préfère des milieux plus ouverts. Au printemps, les montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des arènes, territoires sur lesquels se font les danses. Le mâle dominant occupe l'arène centrale qu'il a obtenu après combat avec d'autres mâles. La montagne du Beure en constitue le seul site d'hivernage connu dans la vallée. L'Aigle royal niche sur les étroites vires rocheuses des falaises. Les pelouses d'altitude constituent de bons terrains de chasse pour ce rapace. Sa vue perçante et son bec crochu lui permettent de prélever de petits mammifères.

Milieus naturels

62.3

DALLES ROCHEUSES

Flore

Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.
Ail à fleurs de Narcisse	<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.
Ail rocamboule (Rocamboule)	<i>Allium scorodoprasum</i> subsp. <i>scorodoprasum</i>
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Cerfeuil des prés	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i>
Aposéris fétide	<i>Aposeris foetida</i>
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata</i> Lam.
Arabette scabre	<i>Arabis scabra</i> All.
Lunetière à tiges courtes	<i>Biscutella brevicaulis</i> Jordan
Buplèvre des rochers	<i>Bupleurum petraeum</i> L.
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris</i> All.
Campanule carillon	<i>Campanula medium</i> L.
Carline à feuilles d'acanthé	<i>Carlina acanthifolia</i>
Centaurée de Trionfetti	<i>Centaurea triumfetti</i>
Cirse tubéreux	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Cytise de Sauze	<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.
Daphné camélé	<i>Daphne cneorum</i> L.
Œillet des rochers	<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery
Panicaut blanche épine	<i>Eryngium spinalba</i>
Vélar jaunâtre	<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleicher) DC.
Dent de chien	<i>Erythronium dens-canis</i> L.
Gagée jaune	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler
Avoine soyeuse	<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel
Impatiante ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Laser de France	<i>Laserpitium gallicum</i> L.
Linnaire couchée	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Minuartie à feuilles capillaires	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebner
Bugrane buissonnante	<i>Ononis fruticosa</i> L.
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Hudson
Orchis pâle	<i>Orchis pallens</i> L.
Peucedan à feuilles de carvi	<i>Peucedanum carvifolium</i>
Raiponce de charmeil	<i>Phyteuma charmelii</i> Vill.
Polygale des sols calcaires	<i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultz
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Primevère oreille d'ours	<i>Primula auricula</i> L.
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Renoncule de Séguier	<i>Ranunculus seguieri</i> Vill.
Saxifrage à bulbilles	<i>Saxifraga granulata</i> L.
Isopyre faux pigamon	<i>Thalictrella thalictroides</i> (L.) E. Nardi
Trèfle beige	<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link
Tulipe méridionale	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.

Faune vertébrée

Mammifères

Bouquetin des Alpes *Capra ibex*

Oiseaux

Aigle royal *Aquila chrysaetos*
Gélinotte des bois *Bonasa bonasia*
Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*
Faucon pèlerin *Falco peregrinus*
Chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum*
Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*
Merle de roche *Monticola saxatilis*
Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*
Chocard à bec jaune *Pyrrhonorax graculus*
Tétras lyre *Tetrao tetrix*
Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*

Reptiles

Lézard vivipare *Lacerta vivipara*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Flore et végétation du plateau de Beure. Commune de St-Agnan en Vercors (Drôme)

27 pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LOOSE D., BRUNEAU G., ADESTRO J.

*La chevêche d'Europe *Glaucidium passerinum* sur la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors*

39 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Parc Naturel Régional du Vercors

Site I27 "Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts Plateaux du Vercors et de la bordure orientale du Vercors" - Document d'objectifs

102 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



26080002

26080001

Feuille 1/2


38230005

Feuille 2/2

Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1




26080001

38230005

Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy