Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **38250010**

Ancien N° régional : 38174802

Bas-marais du Villaret

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 87,52 ha

Isère LA MURE, PIERRE-CHATEL, SAINT-HONORE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **107**

Description et intérêt du site

Les marais alcalins de la Mure sont dominés par les plantes herbacées de la famille des laîches, de petites mousses brunes et de nombreuses espèces à fleurs colorées. Ce type de végétation calcicole se développe sur des sols gorgés d'eau carbonatée, pauvre en nutriments et généralement peu oxygénée. Il forme des habitats naturels remarquables mais de plus en plus résiduels du fait des atteintes qui leur sont portées (abandon de la fauche, drainage, amendements…). La protection de certains d'entre-eux est considérée comme un enjeu européen. En matière de flore, la Gentiane pneumonanthe est une belle plante qui se repère facilement à ses tiges élancées et ses grandes fleurs d'un bleu violacé. Le Choin ferrugineux, souvent confondu avec le Choin noirâtre, moins rare, est une petite plante herbacée des marais tourbeux alcalins, principalement en montagne. On rencontre aussi ici le Saule rampant, ainsi qu'une petite liliacée aux belles fleurs jaune vif : la Gagée jaune. Une petite orchidée discrète et extrêmement rare affectionne les milieux à végétation claire, qui lui permettent de jouer son rôle de plante pionnière colonisatrice des tourbes : c'est le Liparis de Loesel. De nombreux oiseaux d'eau trouvent ici le gîte et le couvert ; ils animent de leurs cris le marais. Les limicoles (parmi lesquels la Bécassine des Marais ou le Chevalier guignette) fouillent la vase pour y chercher des vers. Parmi les canards, le Canard chipeau, le Fuligule morillon et la Tadorne de Belon sont les plus nombreux. Autour des plans d'eau, les roselières forment des cachettes idéales pour les petits passereaux paludicoles comme le Bruant des roseaux, le Pipit farlouse ou la Rousserolle verderolle.

Milieux naturels

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Laîche à deux étamines	*Carex diandra Schrank*
Laîche dioïque	*Carex dioica L.*
Cirse de Montpellier	*Cirsium monspessulanum*
Souchet brun	*Cyperus fuscus L.*
Gagée jaune	*Gagea lutea (L.) Ker-Gawler*
Gentiane des marais	*Gentiana pneumonanthe L.*
Orchis odorant	*Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard*
Liparis de Loesel	*Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard*
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	*Ophioglossum vulgatum L.*
Saule rampant	*Salix repens L.*
Choin ferrugineux	*Schoenus ferrugineus L.*
Scrophulaire des ombrages	*Scrophularia umbrosa Dumort.*
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	*Silaum silaus*
Germandrée d'eau	*Teucrium scordium L.*
Véronique à écussons	*Veronica scutellata L.*

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud commun	*Bufo bufo*
Grenouille rousse	*Rana temporaria*
Triton alpestre	*Triturus alpestris*

Oiseaux

Rousserolle verderolle	*Acrocephalus palustris*
Sarcelle d'hiver	*Anas crecca*
Sarcelle d'été	*Anas querquedula*
Canard chipeau	*Anas strepera*
Pipit farlouse	*Anthus pratensis*
Héron cendré	*Ardea cinerea*
Hibou moyen-duc	*Asio otus*
Fuligule morillon	*Aythya fuligula*
Sizerin flammé	*Carduelis flammea*
Tarin des aulnes	*Carduelis spinus*
Petit Gravelot	*Charadrius dubius*
Cigogne blanche	*Ciconia ciconia*
Circaète Jean-le-Blanc	*Circaetus gallicus*
Busard des roseaux	*Circus aeruginosus*
Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*
Busard cendré	*Circus pygargus*
Pigeon colombin	*Columba oenas*
Caille des blés	*Coturnix coturnix*
Hirondelle de fenêtre	*Delichon urbica*
Pic épeichette	*Dendrocopos minor*
Bruant des roseaux	*Emberiza schoeniclus*
Faucon pèlerin	*Falco peregrinus*
Faucon hobereau	*Falco subbuteo*
Pinson du Nord	*Fringilla montifringilla*
Bécassine des marais	*Gallinago gallinago*
Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*
Goéland leucophée	*Larus cachinnans*
Mouette rieuse	*Larus ridibundus*
Bruant proyer	*Miliaria calandra*
Milan noir	*Milvus migrans*
Bergeronnette printanière	*Motacilla flava*
Bihoreau gris	*Nycticorax nycticorax*
Moineau friquet	*Passer montanus*
Bondrée apivore	*Pernis apivorus*
Hirondelle de rivage	*Riparia riparia*
Tarier des prés	*Saxicola rubetra*
Tadorne de Belon	*Tadorna tadorna*
Chevalier guignette	*Tringa hypoleucos*
Huppe fasciée	*Upupa epops*
Vanneau huppé	*Vanellus vanellus*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BERNARD A., CROUZIER P.

Première preuve de reproduction du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) en région Rhône-Alpes

p 8 pages 1998 Consultable : CORA Région

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GUILLEMAIN M., SCHRICKE V.

Programme de recherches sur la Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Etat d'avancement

p 1 pages 2005 Consultable : ONCFS

LECHANTRE P.

Le mystère des sarcelles d'hiver

p 4 pages 2004 Consultable : ONCFS

SCHRICKE V.

Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula

99 pages 1998 Consultable : ONCFS

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38250010



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)