



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38260001

Ancien N° régional : 38344903

Montagne du Coiro

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 702,48 ha

Isère

LAVALDENS, LE PERIER, ORIS-EN-RATTIER, VALBONNAIS

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 1 | Amphibiens | 2 | Reptiles | 2 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 2 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux | 2 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 1 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 1 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 215

Description et intérêt du site

Mosaïque de milieux naturels, ce secteur situé au sud du massif du Taillefer regroupe des forêts de résineux (hêtraies-sapinières), des rochers, des prairies subalpines. Il présente une riche avifaune montagnarde. La Gélinoite des bois, oiseau aux mœurs très discrètes, est sédentaire. En montagne, son habitat est constitué de futaies mixtes pourvues d'une abondante strate de feuillus arbustifs. Une juxtaposition de conifères et de feuillus est idéale, les bourgeons des sorbiers, bouleaux, saules, aulnes constituant la base de son alimentation. Les cônes des résineux étant la principale source de nourriture du Cassenoix moucheté, il n'est pas rare de l'apercevoir ou de l'entendre, perché au sommet d'un épicéa et poussant son cri rauque, semblable au choc de deux pierres l'une contre l'autre. Le Lagopède alpin, quant à lui, niche à même le sol dans les landes à rhododendron ; on peut aussi observer la Perdrix bartavelle, ou le Tétraz lyre et les belles parades nuptiales de ses mâles. Les espèces rupicoles (Aigle royal, Chocard à bec jaune, Hirondelle des rochers, Tichodrome échelette...) sont entre autres très bien représentées. La flore est tout aussi remarquable. Affectionnant les hêtraies-chênaies ou les forêts de résineux, la Pyrole à feuilles rondes est une espèce bien représentée localement. De nombreuses plantes de grand intérêt sont représentées sur le site : Aconit anthora, Gentiane croisettes, Saussurée discolorée, Clématite des Alpes ou Caillet deltoïde.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

| | |
|--|---|
| Aconit anthora | <i>Aconitum anthora</i> L. |
| Ail victorial | <i>Allium victorialis</i> L. |
| Androsace de Suisse | <i>Androsace helvetica</i> (L.) All. |
| Ancolie des Alpes | <i>Aquilegia alpina</i> L. |
| Génépi blanc | <i>Artemisia umbelliformis</i> subsp. <i>eriantha</i> |
| Micropus dressé | <i>Bombycilaena erecta</i> |
| Buplèvre du Mont Baldo | <i>Bupleurum baldense</i> |
| Clématite des Alpes | <i>Clematis alpina</i> (L.) Miller |
| Œillet à delta | <i>Dianthus deltoides</i> L. |
| Œillet des rochers | <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen |
| Lycopode des Alpes | <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub |
| Fétuque jaunâtre | <i>Festuca flavescens</i> Bellardi |
| Gailllet grêle | <i>Galium spurium</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Kerguelen |
| Gentiane croisetite | <i>Gentiana cruciata</i> L. |
| Épervière de Lawson | <i>Hieracium lawsonii</i> Vill. gr. |
| Orchis bouc | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel |
| Impatiante ne-me-touchez-pas | <i>Impatiens noli-tangere</i> L. |
| Inule des montagnes | <i>Inula montana</i> L. |
| Laser de France | <i>Laserpitium gallicum</i> L. |
| Lis faux Safran | <i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers. |
| Cotonnière des champs | <i>Logfia arvensis</i> (L.) J. Holub |
| Mélilot de Naples | <i>Melilotus neapolitanus</i> Ten. |
| Orchis pâle | <i>Orchis pallens</i> L. |
| Raiponce de charmeil | <i>Phyteuma charmeli</i> Vill. |
| Pleurosperme d'Autriche | <i>Pleurospermum austriacum</i> |
| Polystic à aiguillons | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth |
| Pyrole intermédiaire | <i>Pyrola media</i> Swartz |
| Pyrole à feuilles rondes | <i>Pyrola rotundifolia</i> L. |
| Saule à feuilles de myrte | <i>Salix breviserrata</i> B. Flod. |
| Saussurée discolore | <i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC. |
| Silène à petites fleurs | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel |
| Rhapontique des Alpes (Stemmacanthe rhapontique) | <i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittr. |
| Rhapontique de Lamark | <i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittr. |
| Stipe pennée (Plumet, Marabout) | <i>Stipa pennata</i> L. |
| Véronique à écussons | <i>Veronica scutellata</i> L. |
| Violette de Thomas | <i>Viola thomasiana</i> Song. & Perr. |
| Woodsia des Alpes | <i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray |

Faune vertébrée

Amphibiens

| | |
|-------------------|------------------------|
| Grenouille rousse | <i>Rana temporaria</i> |
|-------------------|------------------------|

Mammifères

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Sérotine commune | <i>Eptesicus serotinus</i> |
| Lièvre variable | <i>Lepus timidus</i> |
| Pipistrelle commune | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> |
| Chamois | <i>Rupicapra rupicapra</i> |

Oiseaux

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Perdrix bartavelle | <i>Alectoris graeca</i> |
| Pipit rousseline | <i>Anthus campestris</i> |
| Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> |
| Hibou moyen-duc | <i>Asio otus</i> |
| Engoulevent d'Europe | <i>Caprimulgus europaeus</i> |
| Circaète Jean-le-Blanc | <i>Circaetus gallicus</i> |
| Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> |
| Pigeon colombin | <i>Columba oenas</i> |
| Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> |
| Bruant ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> |
| Hirondelle de rochers | <i>Hirundo rupestris</i> |
| Lagopède alpin | <i>Lagopus mutus</i> |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> |
| Merle de roche | <i>Monticola saxatilis</i> |
| Cassenoix moucheté | <i>Nucifraga caryocatactes</i> |
| Chocard à bec jaune | <i>Pyrhocorax graculus</i> |
| Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> |
| Bécasse des bois | <i>Scolopax rusticola</i> |
| Tétras lyre | <i>Tetrao tetrix</i> |
| Tichodrome échelette | <i>Tichodroma muraria</i> |

Reptiles

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Lézard vivipare | <i>Lacerta vivipara</i> |
|-----------------|-------------------------|

Faune invertébrée

Papillons

| | |
|---------|--------------------------|
| Apollon | <i>Parnassius apollo</i> |
|---------|--------------------------|

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme


Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy