



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38260004

Ancien N° régional :

Tête de Barhalon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 072,26 ha

Isère LAVALDENS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 184

Description et intérêt du site

Mosaïque de milieux naturels, les alentours de la Tête de Barhalon regroupent des forêts de résineux, des rochers, des moraines, des alpages et des sources et ruisseaux. Ils regorgent ainsi d'espèces remarquables très diversifiées. Il en est ainsi des oiseaux. La Gélinotte des bois, oiseau aux mœurs très discrètes, est sédentaire. En montagne, son habitat est constitué de futaies mixtes pourvues d'une abondante strate de feuillus arbustifs. Une juxtaposition de conifères et de feuillus est idéale, les bourgeons des sorbiers, bouleaux, saules, aulnes constituant la base de son alimentation. Le Sizerin flammé vit dans les zones semi-ouvertes faisant la transition entre la forêt et les alpages ; ce sont des zones dans lesquelles alternent résineux rabougris adoptant des formes de "bonzaï", et prairies ou dalles rocheuses nues : on les désigne couramment sous le nom de "zones de combat". Les cônes des résineux étant la principale source de nourriture du Cassenoix moucheté, il n'est pas rare de l'apercevoir ou de l'entendre, perché au sommet d'un épicéa et poussant son cri rauque, semblable au choc de deux pierres l'une contre l'autre. Le Lagopède alpin, quant à lui, niche à même le sol dans les landes à rhododendron ; on peut aussi observer la Perdrix bartavelle, ou le Tétraz Lyre et les belles parades nuptiales de ses mâles. La flore est tout aussi remarquable. L'Epipogon sans feuille est une orchidée très discrète dépourvue de chlorophylle et puisant ses ressources par l'intermédiaire de champignons auxquels elle s'associe : c'est la mycorhization. Affectonnant les hêtraies-chênaies ou les forêts de résineux, la Pyrole à feuilles rondes est une espèce bien représentée localement. Soulignons encore la présence de la Clématite des Alpes, de la Balsamine des Bois aux fleurs jaune vif et aux fruits renflés, ou de l'Œillet deltoïde.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Aconit anthora	<i>Aconitum anthora</i> L.
Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcangeli) Greuter & Burdet
Ail victorialis	<i>Allium victorialis</i> L.
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Laïche des rochers	<i>Carex rupestris</i> All.
Céraiste des Alpes	<i>Cerastium alpinum</i> L.
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Racine de corail	<i>Corallorrhiza corallorrhiza</i> (L.) Karsten
Céillet à delta	<i>Dianthus deltoides</i> L.
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Epipogon sans feuille	<i>Epipogium aphyllum</i> Swartz
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller
Fétuque jaunâtre	<i>Festuca flavescens</i> Bellardi
Gaillet des Alpes occidentales	<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrend.
Impatiente ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Lis orangé	<i>Lilium bulbiferum</i> L.
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Plantain toujours vert	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz
Polystich à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Potentille des rochers	<i>Potentilla rupestris</i> L.
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Saussurée discoloré	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.
Silène fleur de Jupiter	<i>Silene flos-jovis</i> (L.) Greuter & Burdet
Rhapontique des Alpes (Stemmacanthe rhapontique)	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittr.
Rhapontique de Lamark	<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittr.
Tozzie des Alpes	<i>Tozzia alpina</i> L.
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana</i> Song. & Perr.
Woodsia des Alpes	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray

Faune vertébrée

Mammifères

Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

Oiseaux

Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flamma</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38260004

260008



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)