



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38280002

Ancien N° régional : 38104801

Promontoire de Monteynard

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 865,15 ha

Isère

AVIGNONET, LA MOTTE-SAINT-MARTIN, MARCIEU, MONTEYNARD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 45

Description et intérêt du site

La vallée du Drac, très encaissée à ce niveau, est coupée par un barrage de retenue à l'origine d'un lac artificiel de sept cents hectares. Les falaises surplombant le plan d'eau sont abruptes et restent à l'abri des incursions de l'homme, ce qui favorise la nidification de nombreuses espèces rupestres (Grand Corbeau, Faucons Pèlerin et crécerelle, Grand-duc d'Europe, Hirondelles de rocher...). En automne, le couloir de la vallée est emprunté par des oiseaux se dirigeant vers leur quartier d'hiver. Une flore d'influence méditerranéenne se développe sur les versants méridionaux. On y compte au moins trois espèces végétales remarquables.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Guimauve hérissée	<i>Althaea hirsuta</i> L.
Cytise argenté	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Brome raboteux	<i>Bromus squarrosus</i> L.
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>
Sumac fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.
Gentiane croisetie	<i>Gentiana cruciata</i> L.
Ibéris penné	<i>Iberis pinnata</i> L.
Gesse à graines sphériques	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.
Liondent crépu	<i>Leontodon crispus</i> Vill.
Leuzée à cônes	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Mélilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus</i> Ten.
Bugrane naine	<i>Ononis pusilla</i> L.
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Hudson
Ophrys araignée	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i>
Oxytropis poilu	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum</i> L.
Vulpie unilatérale	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace

Bibliographie


Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères	
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Oiseaux	
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>

Faune invertébrée


Pas de données disponibles



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1