



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38300029

Ancien N° régional :

Forêt et rochers de la rive gauche du Vénéon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 393,53 ha

Isère

SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 38

Description et intérêt du site

Etablie dans la partie sud-est du département de l'Isère, la haute vallée du Vénéon s'insère profondément à l'intérieur du Haut Oisans. Principal affluent de la Romanche, ce torrent prend sa source au niveau du Glacier de la Pilatte. La haute vallée s'inscrit dans une ambiance paysagère très fortement minérale de haute montagne glaciaire et rocheuse, où prédominent les escarpements rocheux, les éboulis, les moraines et les appareils glaciaires qui donnent naissance à des torrents tumultueux charriant des eaux troubles cristallines. Protégée de toute part à l'abri de reliefs importants de hautes crêtes, elle est soumise à un climat de type montagnard continental intra-alpin. Elle est par ailleurs ouverte sur les vallées occidentales des Alpes dauphinoises subissant encore les influences climatiques atlantiques atténuées. Elle constitue donc un îlot de continentalité relativement sec et froid, isolé à l'est par de hautes barrières et à l'ouest par ces influences humides. Le site concerne pour l'essentiel la partie inférieure du versant ubac de la vallée du Vénéon, face aux hameaux de Pré Clot et de Champhorent. Il englobe en particulier les forêts de la Mariande et des Bancs. Des forêts anciennes d'Epicéa (ou pessières), jusqu'à présent peu exploitées en raison des difficultés d'accès et donc présentant des arbres âgés, constituent le principal intérêt du site. Ces formations forestières sont des reliques de la végétation forestière d'origine en Haut Oisans. Ces milieux forestiers sont associés à des formations de mégaphorbiaies (associations végétales composées de hautes herbes opulentes, occupant les ravins froids et humides aux étages montagnards et subalpins), à des prairies subalpines, et à divers types de milieux rocheux : éboulis et escarpements. Des landes subalpines d'ubac à Rhododendron ferrugineux, Myrtille et Airelle bleue surmontent ces espaces forestiers et assurent la transition vers les pelouses alpines. Localement, au niveau d'éperons rocheux secs et ensoleillés, apparaissent des pelouses rases xérophiles (adaptées à la sécheresse) et des pelouses pionnières associant joubarbes et orpins. Parmi les plantes remarquables ou spectaculaires, signalons la Campanule en épi, la Clématite des Alpes (plante lianescente rampante des boisements clairs et landes sur chaos rocheux et éboulis, aux singulières fleurs bleu violacé) et le Lys orangé. La Camarine noire, sous-arbrisseau des landes froides aux petites baies noires comestibles, est un hôte peu fréquent des landes froides d'ubac. La faune locale comprend des représentants particulièrement remarquables ou emblématiques, comme l'Aigle royal, le Tétraz lyre ou le Lièvre variable, rare espèce relique héritée des glaciations quaternaires.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Fétuque jaunâtre	<i>Festuca flavescens</i> Bellardi
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Mammifères	
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Oiseaux	
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.
Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore
13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Parc National des Ecrins
Atlas du Parc national des Ecrins
64 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38300029



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)