



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42000013

Ancien N° régional :

Ponts et vallée de l'Urbise

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 68,93 ha

Loire URBISE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	0	Crustacés	1	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Cette zone est située aux confins nord-ouest du département de la Loire à sa jonction avec les départements de la Saône et Loire et de l'Allier, à hauteur du village d'Urbise. Le cours d'eau du même nom traverse le village du sud-ouest au nord-est avant de poursuivre son chemin en direction de la Loire. L'intérêt faunistique local est double :- le cours d'eau abrite la Lamproie de Planer. Ce poisson est un bon indicateur d'eaux vives et non polluées. Il s'agit de la seule lamproie française vivant en permanence dans des eaux douces. Les jeunes lamproies se nourrissent en filtrant dans la vase des organismes microscopiques. Une fois atteint l'âge adulte, elles ne se nourrissent plus jusqu'à leur mort. - les ponts enjambant le cours de l'Urbise offrent des gîtes de reproduction privilégiés pour les chiroptères (ou chauve-souris). Sous les trois ponts proches du bourg, la présence chaque été du Vespertilion de Daubenton en petite colonie de parturition (mise-bas) a été confirmée. Les effectifs étaient les mêmes pour les deux premiers ponts (huit individus) et supérieurs pour le troisième pont (dix individus lors de la moins bonne année). Le Vespertilion de Daubenton est une "chauve-souris des rivières"; elle est capable de nager et de s'envoler depuis la surface de l'eau. C'est en effet au-dessus de l'eau, au crépuscule, qu'elle va chasser les petits insectes (moustiques ou papillons de nuit) avant de les manger en vol. L'espèce est répandue en Europe centrale et au nord jusqu'au 63ème parallèle environ. C'est aussi le cas en France et en région Rhône-Alpes, où il s'agit de l'une des espèces les plus "contactées" par les chiroptérologues.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Vespertilion de Daubenton *Myotis daubentoni*

Poissons

Lamproie de Planer *Lampetra planeri*

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BILLARD R.

Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces

192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GUILLERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".


34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Liberté - Égalité - Fraternité
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42000013



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)