



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42000042

Ancien N° régional :

Bois et prairies humides du Châtelet et de Vatron

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 69,77 ha

Loire BELMONT-DE-LA-LOIRE, ECOCHE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

Description et intérêt du site

Cette zone est située dans l'extrémité nord-est du département de la Loire, non loin du village de Belmont-de-la-Loire. Rattachée au Haut-Beaujolais, qui s'étend plus à l'est dans le département du Rhône, elle présente la flore la plus atlantique de la région Lyonnaise (au sens large). En effet, cette influence atlantique, encore bien perceptible plus à l'ouest dans les monts de la Madeleine, s'estompe dans le Haut-Beaujolais puis devient très discrète plus à l'est de la région Rhône-Alpes. L'intérêt naturaliste local est donc avant tout botanique. Des espèces d'affinité atlantique trouvent ici refuge. C'est le cas de la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre, protégée dans le département de la Loire, et qui atteint dans le Haut-Beaujolais sa limite est de répartition. On trouve dans ce secteur seulement une quinzaine de stations pour cette plante qui occupe les milieux humides, frais et mi-ombragés. Elle est accompagnée sur ce site par la Petite Scutellaire, abondante dans la prairie humide située près du hameau de Vatron. Il s'agit d'une plante discrète, aux petites fleurs rosées. C'est une espèce protégée en région Rhône-Alpes. Elle se rencontre le plus souvent sur le bord des ruisseaux. Une autre espèce protégée en région Rhône-Alpes est présente sur cette zone. Il s'agit du Millepertuis à baie (ou Androsème) qui occupe quant à lui les bois humides ombragés. Ses baies rouges, puis noires, à suc rouge sang sont caractéristiques. Il est peu abondant sur ce secteur puisque l'on compte seulement une dizaine de pieds. Il s'agit de l'une des seules stations de ce millepertuis dans le département de la Loire, où il est également présent dans le Massif du Pilat.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Millepertuis androsème	<i>Hypericum androsaemum L.</i>
Petite Scutellaire	<i>Scutellaria minor Hudson</i>
Campanille à feuilles de Lierre (Wahlenbergie à feuilles de lierre)	<i>Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

MUNOZ F.

Note sur la présence de Wahlenbergia hederacea Reich. dans le Haut-Beaujolais (Est du Massif central, France)

177 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°4200042

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)