



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42030001

Ancien N° régional : 42040906,42040901,42040903

Landes de Joeuvre

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 173,76 ha

Loire

CORDELLE, ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 6

Description et intérêt du site

Ce site inclut les gorges aval de la Loire, à proximité du barrage de Villerest. Les pentes escarpées sont occupées par des boisements et des landes et les replats par des prairies. Les prairies situées en bord de Loire, elles sont pâturées par des moutons et des chevaux. Les landes à Genêt purgatif de la presqu'île de Joeuvre permettent la nidification du Busard cendré. Il s'agit ici de l'un des seuls couples nicheurs du Roannais. Ce busard niche à même le sol dans les landes. On retrouve également sur cette zone le plus grand rapace nocturne d'Europe, il niche dans la falaise en dessous du hameau de Chevenet. Il s'agit du Hibou Grand-duc que l'on peut très facilement entendre pendant les soirées d'hiver lorsqu'il appelle sa femelle. Ce hibou atteint une envergure de 1,6 à 1,9 m. C'est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et arrondies et une grosse tête surmontée de deux aigrettes. Pendant le jour, il se tient caché sur les rochers grâce à son plumage d'une couleur fauve discrète. Bien que ses effectifs soient en augmentation depuis une trentaine d'années, ce rapace reste assez rare puisque l'on estime la population nicheuse inférieure à 1500 couples pour toute la France. Dans le département de la Loire, le Grand-duc d'Europe est localement bien répandu, occupant presque tous les sites de nidification potentiels. Il devient ainsi occasionnellement forestier. Il convient toutefois de rappeler que l'Est du Massif central constitue un des bastions majeurs de l'espèce dans notre pays.

Milieux naturels

31.842	LANDES A CYTISUS PURGANS
--------	--------------------------

Faune vertébrée

Oiseaux	
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CUSSET Y.
Potentilla norvegica dans le Pilat et autres potentilles ligériennes
15- pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

WASSON J.G., BETHEMONT J., DEGORCE J.N., DUPUIS B., JOLIVEAU T.
Approche écosystémique du bassin de la Loire : éléments pour l'élaboration des orientations fondamentales de gestion. Phase 1, état initial - problématique. Atlas version définitive.
n.p. pages 1993 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes


Approche écosystémique du bassin de la Loire : éléments pour l'élaboration des orientations fondamentales de gestion. Phase 1, état initial - problématique. Rapport version définitive
n.p. pages 1993 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42030001



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)