Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **42030007**

Ancien N° régional : 42040904

Fourré du Verdier

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 103,33 ha

Loire CORDELLE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **5**

Description et intérêt du site

Les fourrés du Verdier sont situés en rive droite de la Loire, dans le secteur des gorges de la Loire aval, à proximité du barrage de Villerest. Il s'agit d'une ancienne vigne où la dynamique naturelle de la végétation poursuit son avancée. La partie haute de ce petit mont est encore pâturée tandis que les coteaux sont envahis par des buissons. Des arbustes comme l'Erable de Montpellier forment des bouquets au sein du fourré. Cette espèce est ici en limite nord de son aire de répartition et reste fort bien représentée. On admire aussi sur les pelouses la Pulsatille rouge, protégée en région Rhône-Alpes. Sa fleur pendante aux corolles pourpres sombres, qui s'épanouit d'avril à juin, est d'une beauté exceptionnelle. L'Aconit de Napel est ici observée à une altitude exceptionnellement basse. La présence de l'Alouette lulu, oiseau des terrains secs et ensoleillés, confirment les conditions sub-méditerranéenne du site. Cette espèce est en déclin en Europe. Il est présent en France toute l'année, mais il est surtout fréquent dans le sud-est. Il émet un chant mélodieux, en phrases flûtées. Cette espèce a longtemps bénéficié de l'action de l'homme, visant à maintenir des paysages d'herbages ouverts. S'agissant de la flore, on retrouve sur les zones plus en pelouses la Pulsatille rouge, protégée en région Rhône-Alpes. Sa fleur pendante aux corolles pourpres sombres est d'une beauté exceptionnelle. Elle fleurit d'avril à juin.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Grand-duc d'Europe	*Bubo bubo*
Alouette lulu	*Lullula arborea*

Flore

Aconit napel	*Aconitum napellus L.*
Pulsatille rouge	*Pulsatilla rubra Delarbre*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

WASSON J.G., BETHEMONT J., DEGORCE J.N., DUPUIS B., JOLIVEAU T.

Approche écosystémique du bassin de la Loire : éléments pour l'élaboration des orientations fondamentales de gestion. Phase 1, état initial - problématique. Atlas version définitive.

n.p. pages 1993 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Approche écosystémique du bassin de la Loire : éléments pour l'élaboration des orientations fondamentales de gestion. Phase 1, état initial - problématique. Rapport version définitive

n.p. pages 1993 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°42030007



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)