



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42060006

Ancien N° régional :

Tourbière des Roussis

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 17,49 ha

Loire SALLES (LES)

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 3 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux sucoérieurs | 3 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 15

Description et intérêt du site

Le massif des Bois Noirs est situé au nord-ouest du département de la Loire, à cheval sur les régions Auvergne et Rhône-Alpes. C'est un vaste massif granitique entièrement boisé dont le sommet est à 1287 m d'altitude au Puy de Montoncel. Les précipitations abondantes (entre 1000 et 1300 mm par an) ont permis la formation de nombreuses tourbières au sein de la forêt dominée par les sapins. La tourbière des Roussis est située au sud du col de Saint-Thomas. Ce site présente des habitats naturels remarquables et notamment de très belles étendues de tourbière boisée à bouleaux et de bois tourbeux de Pin sylvestre. A l'extrémité sud du site, à l'exutoire de la tourbière, d'anciennes ruines et un muret forment une retenue pour l'écoulement de l'eau. Une cariçaie (formation végétale dominée par les laïches) à Laïche à utricules contractés en bec occupe les lieux ; elle est colonisée par des saules. Plusieurs plantes protégées ont été recensées sur la tourbière. La Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre est abondante au nord, dans le périmètre de captage d'eau. Cette espèce atlantique, protégée dans le département de la Loire, trouve en région Rhône-Alpes sa limite orientale de répartition. La Canneberge est plus localisée, occupant quelques buttes de sphaignes au nord du site. Concernant la faune, on remarque la présence de la Gêlinotte des bois, ce qui est particulièrement intéressant. Cet oiseau aux mœurs très discrètes est sédentaire. Très peu d'observations de cette espèce sont attestées dans le département de la Loire ; les monts du Forez et les Bois Noirs seraient d'ailleurs les seuls abritant encore cette espèce dans l'ensemble du Massif Central.

Milieus naturels

| | |
|-------|----------------------------------|
| 44.A1 | BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES |
| 44.A2 | BOIS TOURBEUX DE PINS SYLVESTRES |
| 54.5 | TOURBIERES DE TRANSITION |

Faune vertébrée

Mammifères

| | |
|-----------------|------------------------|
| Lièvre d'Europe | <i>Lepus europaeus</i> |
|-----------------|------------------------|

Oiseaux

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Gélinotte des bois | <i>Bonasa bonasia</i> |
|--------------------|-----------------------|

Flore

| | |
|--|---|
| Linaigrette engainante | <i>Eriophorum vaginatum L.</i> |
| Gnaphale de Norvège | <i>Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S</i> |
| Potentille des marais (Comaret) | <i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i> |
| Séneçon faux-cacalia | <i>Senecio cacaliaster Lam.</i> |
| Canneberge à gros fruits | <i>Vaccinium oxycoccos L.</i> |
| Campanille à feuilles de Lierre (Wahlenbergie à feuilles de lierre) | <i>Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.</i> |

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CESAME

Suivi scientifique 2001 de la tourbière des Roussis (Des Salles)

40 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Suivi scientifique de la tourbière des Roussis : commune des Salles

40 pages 2001 Consultable : Conseil Général de la Loire

COÏC B.

Inventaire des tourbières de la Région Rhône-Alpes : département de la Loire

non pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Inventaire et diagnostic écologique des tourbières et zones humides d'altitude de la Loire : fichier des 35 sites sélectionnés

non pages 1994 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CUBIZOLLE H., SACCA C., TOURMAN A., PORTERET J., THEBAUD G.

Les tourbières du haut bassin versant de la Loire (Massif Central oriental) : intérêts paléoenvironnemental et phytocénétique, enjeux socio-économiques.

95- pages 2004 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

FRAPPA F.

Suivi scientifique des habitats naturels dans le site Natura 2000 des Bois Noirs (année 2001)

16 pages 2001 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

HERAULT E.

Compléments cartographiques des habitats naturels du site Natura 2000 FR8301045 "Bois Noirs"

44 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

JULVE Ph.

Plan de gestion de la tourbière des Roussis

70 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Réserves Naturelles de France


Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR8301045 "Bois Noirs"

30 pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°4206006



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)