



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090004

Ancien N° régional : 42022103,42022130

Etangs Lavergnat

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 28,28 ha

Loire BOISSET-LES-MONTROND

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 12

Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui a donné naissance aux sols actuels. L'altitude moyenne est de 360 m. La topographie, entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais, entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans la plaine, où elles alimentent la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L'abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création d'étangs pour la pisciculture. Aujourd'hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez, représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. A l'ouest du fleuve Loire, les étangs Lavergnat sont positionnés au cœur d'une vaste zone de prairies et de pâturage jonchées çà et là de cultures. Ces étangs qui ne sont rattachés à aucune "plaque" d'étangs homogène accueillent au gré des flux migratoires de nombreuses espèces d'oiseaux : anatidés, laridés et autres limicoles. Ainsi, cette fréquentation régulière aux deux passages en fait un site particulier et précieux pour l'avifaune : Chevalier sylvain, Chevalier gambette, Chevalier aboyeur, Chevalier arlequin et Bécasseaux variable et maubèche, Petit Gravelot sont régulièrement observés. Il en est de même de la plupart des anatidés migrateurs et occasionnellement des petits groupes de Mouettes mélanocéphales. Mais c'est aussi en période de reproduction que la qualité de ce milieu se révèle. De nombreuses espèces viennent s'y reproduire, comme la rare Rousserolle turdoïde (la plus grosse des fauvettes paludicoles), ou le Canard souchet dont le long bec caractéristique en spatule lui permet de se nourrir de végétaux microscopiques en filtrant l'eau. L'Echasse blanche est un limicole aux très longues pattes rouges, qui se reproduit ici certaines années. Parmi les autres nicheurs remarquables, on peut citer le Grèbe à cou noir, la Nette rousse, la discrète Sarcelle d'été ou encore la Guifette moustac. A cette faune s'ajoute une flore tout aussi remarquable, et en regardant de plus près, on découvre la Renoncule scélérate, l'Oseille maritime ou encore l'Utriculaire commune. D'autres espèces certes plus communes viennent renforcer ce cortège faunistique et floristique.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus L.</i>
Patience maritime (Oseille maritime)	<i>Rumex maritimus L.</i>
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris L.</i>

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GUILLERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".

34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O. et al.

Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux

114 pages 1996 Consultable : Pôle Relais Tourbières

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

RUFRA Y X., RUFRA Y V., CRAMM P.

L'hivernage de la Guifette moustac (Chlidonias hybridus) en France continentale, période 1973-1996

p 3 pages 1998 Consultable : CORA Région

SCHRICKE V.

Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula

99 pages 1998 Consultable : ONCFS




Liberté - Égalité - Fraternité
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090004

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)