



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090014

Ancien N° régional : 42022157

Etang Mazoyer

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 30,18 ha

Loire

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 10

Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. L'altitude moyenne est de 360 m. La topographie, entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais, entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans la plaine, où elles alimentent la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L'abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création d'étangs pour la pisciculture. Aujourd'hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez, représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. L'étang Mazoyer se trouve à quatre kilomètres au sud de Feurs, entre la route nationale et la voie de chemin de fer. C'est un étang isolé toutefois proche de la "plaque" des étangs de Feurs-Valeille. Son intérêt ornithologique et botanique est important. De même, le milieu bocager à l'est de l'étang accueille deux espèces d'oiseaux à fort intérêt : la Huppe fasciée et le Courlis cendré. La première niche dans les arbres creux et sa présence est liée à celle de vieux arbres dans les haies. Quant au courlis, il niche au sol dans les prairies parmi la végétation herbacée. Sur l'étang, le Canard chipeau est nicheur. Il est reconnaissable à sa couleur grise et à ses miroirs blancs. Quelques couples de Fuligule milouin s'y reproduisent également.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Flore

Naïade marine	<i>Najas marina</i> L.
Petite Naïade	<i>Najas minor</i> All.
Rubaniér émergé	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris</i> L.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GUILLERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".

34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.


67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire
et de la Mer

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090014



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)