



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090019

Ancien N° régional : 42022134

Etang David et milieux humides annexes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 29,68 ha

Loire

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, URBISE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 38

Description et intérêt du site

L'étang David fait partie de la "plaque" sud des étangs du Forez. De nos jours, plus de trois cents étangs subsistent dans le Forez, riches d'une diversité biologique exceptionnelle faisant de cette plaine une zone humide reconnue d'importance nationale et européenne. La plaque sud est caractérisée par la présence plus importante de cultures contrairement aux autres plaques d'étangs. Le site de l'étang David est particulièrement intéressant puisqu'il présente au sud-est et au sud-ouest des boisements et prairies humides vitaux pour de nombreuses espèces animales qui trouvent là des lieux pour se reproduire et pour s'alimenter. Un lotissement est par contre situé en bordure nord-est du site. S'agissant de la flore, plus de cent quarante espèces ont été recensées, dont dix sont protégées. Parmi elles, on observe la Fougère d'eau (ou Marsilée) à quatre feuilles. Cette fougère, protégée en France, est également considérée d'intérêt européen. La Grande douve a été découverte ici en juin 2000. Elle est reconnaissable à ses feuilles étroites pouvant atteindre vingt-cinq centimètres et à sa hauteur imposante. Ses très grandes fleurs sont d'un jaune vif, comme chez beaucoup d'autres renoncules. Elle est protégée en France et très rare dans le département de la Loire. L'Utriculaire commune est par contre plus fréquente dans les étangs du Forez (elle y est présente sur près de trois quarts des sites dénombrés). Plante carnivore, ses feuilles en lanières portent de petites outres, appelées utricules, capables de capturer de petits animaux. Entièrement immergée, l'Utriculaire commune passe inaperçue une grande partie de l'année. Elle se remarque en été par la présence de petites fleurs jaune vif qui apparaissent à la surface de l'eau. Parmi les trois espèces de potamots recensés ici, le Potamot à feuilles pointues est le plus remarquable. Il est protégé en région Rhône-Alpes. Concernant la faune et plus particulièrement les oiseaux, l'étang David héberge de nombreux Grèbes à cou noir, un des fleurons de l'avifaune forézienne puisque cette région abrite environ le quart de la population nicheuse française de l'espèce. En période nuptiale, son cou noir, son œil rouge et ses éventails dorés à la tête en font un des oiseaux les plus agréables à observer. Toujours au chapitre des oiseaux d'eau, les Fuligules milouin et morillon hivernent régulièrement. Plusieurs ardélidés (hérons) sont eux présents en période de nidification, dont l'Aigrette garzette et le Bihoreau gris, ce qui est assez peu surprenant. Par contre, la présence du Phragmite des joncs est beaucoup plus intéressante. C'est en effet un nicheur très rare dans le département de la Loire où seulement neuf données ont été collectées depuis 1973.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Cornifle immergé	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.
Marsilée à quatre feuilles	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.
Naiade marine	<i>Najas marina</i> L.
Petite Naiade	<i>Najas minor</i> All.
Potamot à feuilles pointues	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link
Renoncule Langue (Grande douve)	<i>Ranunculus lingua</i> L.
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
Scirpe mucrone	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla
Rubanier émergé	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris</i> L.

Faune vertébrée

Oiseaux	
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

AKENE
Diagnostic préalable à l'acquisition du domaine de l'étang David de Sauzée : scénarios de mise en valeur et de gestion
140 pages 1992 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BLACHE S.
La Chevêche d'Athéna : rapport 2005
20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CESAME
Plan de gestion Domaine David, première phase : diagnostic
95 pages 1995 Consultable : Conseil Général de la Loire
Plan de gestion du domaine David : diagnostic, enjeux, propositions
123 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central
Plan de gestion du domaine David : première phase diagnostic
non pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Conseil Général du Rhône
Projet de Valorisation de l'étang David (St Just-St Rambert)
25 pages 1998 Consultable : Conseil Général de la Loire

CORA
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.
Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)
37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

GUILLEMAIN M., SCHRICKE V.

Programme de recherches sur la Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Etat d'avancement

p 1 pages 2005 Consultable : ONCFS

LECHANTRE P.

Le mystère des sarcelles d'hiver

p 4 pages 2004 Consultable : ONCFS

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

SEYTRE L.

Diagnostic de la flore et des végétations de l'étang David (Saint-Just-Saint-Rambert, Loire)

83 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne


p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090019



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)