



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090028

Ancien N° régional : 42022123,42022128,42022103

Plaine de Précieux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 655,78 ha

Loire PRECIEUX, SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 9

Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. Il s'agit d'un bassin d'effondrement d'âge tertiaire, recouvert au quaternaire par les alluvions du fleuve à l'origine des sols actuels. L'altitude moyenne est de 360 m. Le secteur décrit se situe sur une zone dite de "chaninats", sols maigres, voués à une activité agricole extensive. A proximité des villages de Saint-Romain le Puy et de Précieux, cette zone se compose de prairies temporaires (foin et Ray-grass), de prairies permanentes pâturées, de parcelles de céréales et en maïs. Les pâturages pour l'élevage bovin (charolais) trouvent leur place sur les parcelles les plus difficilement exploitables. De par son caractère prairial, le secteur de Précieux présente une importante richesse ornithologique, que la présence d'un étang renforce encore. En période de reproduction, tout un cortège d'espèces typiques des milieux ouverts utilisent prairies et cultures pour se reproduire : le Courlis cendré, le Vanneaux huppé, l'Oedicnème criard, la Caille des blés, et parmi les passereaux le Tarier des près, le Moineau friquet, la Bergeronnette printanière apprécient particulièrement le secteur de Précieux pour élever leurs nichées. L'étang de la Sauzée attire également de nombreux oiseaux d'eau en période d'hivernage ou en période de reproduction. Une colonie de Mouettes rieuses occupe ainsi le plan d'eau chaque année pour sa reproduction. Profitant du nombre et de l'agressivité de ces alliés inattendus, le Grèbe à cou noir s'installe ensuite dans la colonie. Cet étang est composé d'un vaste plan d'eau libre avec une ceinture végétale développée sur les trois quarts de ses berges ; seule la partie sud est ainsi exempte de végétation aquatique. Des chênes et quelques frênes côtoient le chemin vicinal qui longe cette partie de l'étang. Les bois et taillis au nord du site attenants à l'étang possèdent une grande variété de passereaux. On trouve dans cette mosaïque de paysages des espèces comme l'Alouette des champs et le Pigeon colombin, le Roitelet triple-bandeau, le Tarier pâle. Lieu méconnu mais très riche, l'étang de la Sauzée présente tout ce qui fait la particularité des étangs du Forez : de nombreux canards y nichent (Fuligule milouin, Canard chipeau) avec une espèce remarquable : le Canard souchet. Le Héron pourpré est nicheur en petit nombre. Quant aux Guifettes moustacs, elles font leur arrivée lorsque les nénuphars apparaissent. On peut alors admirer leur vol chaloupé. Autre particularité : la Bécassine des marais hiverne régulièrement ici. Enfin, certains reptiles comme la couleuvre à collier sont également présents.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Edicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

GUILLEMERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".

34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O. et al.

Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux

114 pages 1996 Consultable : Pôle Relais Tourbières

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

RUFRAY X., RUFRAY V., CRAMM P.

L'hivernage de la Guifette moustac (Chlidonias hybridus) en France continentale, période 1973-1996

3 pages 1998 Consultable : CORA Région

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne


4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090028



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)