



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090032

Ancien N° régional : 42022115

Etang la Vallon

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 21,90 ha

Loire CHAMPDIEU

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	3			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 24

Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. L'altitude moyenne est de 360 m. La topographie, entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais, entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans la plaine, où elles alimentent la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L'abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création d'étangs pour la pisciculture. Aujourd'hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez, représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. L'étang la Vallon est situé non loin de Montbrison. Il fait partie d'une "plaque" d'étang assez lâche qui englobe aussi les étangs de Bullieu, de Mornand et les étangs du Roi. Il constitue un ensemble homogène avec l'étang Perrin et les étangs de Grangeneuve. Ce secteur est particulièrement bocager et des alignements de gros chênes contribuent à procurer à l'ensemble un aspect verdoyant. L'étang la Vallon est bordé de prairies et sa face nord-ouest est formée par une berge en pente douce, en continuité avec la prairie. Les Vanneaux huppés fréquentent cette zone en toutes saisons, de même que les limicoles de passage. Les bordures est et ouest de l'étang sont occupées par des roselières très intéressantes pour les ardéidés (hérons) et les fauvettes aquatiques. Parmi les oiseaux nicheurs, sur l'étang principal lui-même, ou sur les deux petits étangs voisins, on dénombre la Bergeronnette printanière, le Busard des roseaux, les Canards chipeaux et souchet, le Fuligule morillon et la Nette rousse. Cette dernière est un canard plongeur à grosse tête et cou assez long au vol. Le mâle est reconnaissable à son long bec rouge corail et à sa tête roux orangé rehaussée d'un cimier doré. Le Grèbe à cou noir est également nicheur, de même que la Mouette rieuse. Au passage on peut aussi observer le Balbuzard pêcheur, la Barge à queue noire et le Tadorne de belon. Parmi les hérons se distinguent le Héron pourpré et le Héron gardeboeufs dans les prairies autour, et parmi les limicoles, le Petit Gravelot. La Guifette moustac fréquente également ces étangs pour son alimentation.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Marsilée à quatre feuilles *Marsilea quadrifolia L.*

Faune vertébrée

Oiseaux

Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
Héron gardebœufs	<i>Bubulcus Ibis</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BERNARD A., CROUZIER P.

Première preuve de reproduction du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) en région Rhône-Alpes

p 8 pages 1998 Consultable : CORA Région

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GALTIER J.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. dans la plaine du Forez (Loire)

229 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GUILLERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".

34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090032



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)