



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090035

Ancien N° régional :

Prairie humide de Saint Paul d'Uzore

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 0,94 ha

Loire

SAINT-PAUL-D'UZORE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	0	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Cette petite zone est située tout près du village de Saint-Paul d'Uzore, dans la partie ouest de la plaine du Forez, au pied du Mont d'Uzore. Il s'agit d'une prairie humide qui reste inondée quatre à cinq mois par an. Le principal intérêt naturaliste du site est lié à la présence d'une plante remarquable, la Gratiola officinale. Ses fleurs latérales roses pâles et ses feuilles opposées étroitement lancéolées assurent une reconnaissance facile au milieu de la végétation. Cette plante, protégée en France, est en forte régression dans les régions où on peut l'observer, notamment en région Rhône-Alpes. Elle n'a été découverte sur ce site qu'en 1991. La prairie humide est dominée par des joncs accompagnés de quelques espèces caractéristiques moins recouvrantes. Elle est délimitée à l'ouest par un fossé alimenté pour partie par le ruisseau de Félines et par les eaux du canal du Forez. La partie la plus humide est localisée le long de ce fossé. En 1995, la station était composée d'une dizaine de touffes de vitalité variable. En 2000, la Gratiola est toujours présente en compagnie d'un cortège de plantes caractéristiques : Héléocharis des marais, Laîche cuivrée, Spirée ulmaire, Salicaire commune, Achillée sternutatoire, Lotier de marais... Le maintien de cette espèce remarquable est directement lié à la fauche régulière de la prairie humide (une à deux fois par an), et surtout à l'absence de fertilisation importante. La Gratiola est en effet extrêmement sensible aux apports de fertilisants et au pâturage, même extensif.

Milieux naturels

34.322G	MESOBROMION LIGERIEN
34.332D	XEROBROMION LIGERIEN

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis</i> L.
----------------------	--------------------------------

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes
Gratiolle officinale de Saint-Paul-d'Uzore : diagnostic patrimonial et propositions
7 p. pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central


GALTIER J.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. dans la plaine du Forez (Loire)
229 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090035



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)