



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090047

Ancien N° régional : 42022139, 42022140, 42022141

Etang d'Ormaie, des Longes et des Chazeaux

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 346,44 ha

Loire

BUSSY-ALBIEUX, POMMIERS, SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 127

Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. L'altitude moyenne est de 360 m. La topographie, entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais, entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans la plaine, où elles alimentent la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L'abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création d'étangs pour la pisciculture. Aujourd'hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez, représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. Sur la "plaque" des étangs d'Arthun-Sainte-Foy-Saint-Sulpice, le groupe formé par les étangs d'Ormaie, des Longes et des Chazeaux est particulièrement intéressant d'un point de vue écologique. La taille de l'étang d'Ormaie (le plus grand de la plaine du Forez) et sa proximité avec les étangs des Longes font en effet de ce secteur une zone particulièrement intéressante pour les populations d'oiseaux et la flore. Les très grandes ceintures de végétation et les vastes roselières de ses étangs sont un facteur attrayant supplémentaire. On peut y rencontrer la plupart des espèces d'oiseaux communs, auxquelles viennent s'ajouter des espèces plus rares. Sur les plans d'eau, le Canard chipeau peut être vu en toute saison, tout comme les Fuligues milouin et morillon. Ces derniers sont des nicheurs rares en plaine du Forez. La Nette rousse, autre canard plongeur dont le mâle très coloré possède une grosse tête rousse avec un bec rose niche régulièrement. La très rare et discrète Sarcelle d'été, reconnaissable à son large sourcil blanc habite aussi ses étangs. Le Grèbe à cou noir, est parmi les plus beaux oiseaux des étangs : sa tête noire est ornée d'un magnifique masque de plume doré autour de l'œil rouge. Il se nourrit de petits poissons en plongeant. Dans les roselières, ce sont d'autres espèces qui occupent les lieux. Elles sont souvent plus discrètes et profitent de la végétation pour se cacher. Le Héron pourpré et le Busard des roseaux nichent au cœur des roselières. Si le premier construit un nid, le second niche à même le sol. Le très rare Blongios nain est également un hôte typique de la roselière. Ce héron minuscule ne se montre qu'au crépuscule, moment où il part en quête de nourriture. Les étangs sont aussi remarquables par la présence de plusieurs espèces de fauvettes paludicole : la Rousserolle turdoïde, le Phragmite des joncs et la Locustelle luscinioides. Ils présentent également des stations de plantes rares, dont treize sont protégées. Parmi celles-ci, on remarque la Gratiola officinale et la seule station du département d'Ecuelle d'eau. Celle-ci est protégée en région Rhône-Alpes tout comme la Naïade marine ou encore la Renoncule scélérate et l'Oseille maritime. Le bocage alentour accueille également une avifaune remarquable et en particulier des oiseaux prairiaux comme le Courlis cendré et le Vanneau huppé. De nombreux oiseaux migrateurs font ici escale avant de continuer leur périple.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis L.</i>
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>
Lythrum à feuilles d'Hysope	<i>Lythrum hyssopifolia L.</i>
Marsilée à quatre feuilles	<i>Marsilea quadrifolia L.</i>
Naiade marine	<i>Najas marina L.</i>
Petite Naiade	<i>Najas minor All.</i>
Œnanthe fistuleuse	<i>Oenanthe fistulosa L.</i>
Peucedan officinal	<i>Peucedanum officinale L.</i>
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus L.</i>
Patience maritime (Oseille maritime)	<i>Rumex maritimus L.</i>
Scirpe mucrone	<i>Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla</i>
Scirpe couché	<i>Schoenoplectus supinus (L.) Palla</i>
Rubanier émergé	<i>Sparganium emersum Rehmann</i>
Utriculaire commune	<i>Utricularia vulgaris L.</i>

Faune vertébrée

Oiseaux

Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Grande Aigrette	<i>Egretta alba</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Locustelle lusciniôïde	<i>Locustella luscinioides</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Chevalier guignette	<i>Tringa hypoleucos</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CESAME

Etude de faisabilité du plan Forez. Annexes.

n.p. pages 1994 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Etude de faisabilité du plan Forez. Bilan en eau des trois principales zones d'étangs.

19 pages 1994 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Etude de faisabilité du plan Forez. Rapport de synthèse.

110 pages 1994 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Etude de faisabilité du plan Forez. Résumé.

32 pages 1994 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Conseil Général de la Loire

Plan Forez, bilan du programme 1995-1998.

13 pages 1998 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Gratiole officinale de Saint-Paul-d'Uzore : diagnostic patrimonial et propositions

7 p. pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FREMILLON J-L

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en Isère

p 1- pages 1990 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

GALTIER J.

Contribution à la connaissance de la flore du Forez (Loire)

218 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GUILLERME N.

Les communautés végétales aquatiques des étangs de la plaine du Forez

305 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GUILLERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".

34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.

Enquête sur le Blongios nain

p 1 pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

KERBIRIOU E.

Restauration et gestion des habitats du Butor étoilé en France

11 pages Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

LPO

Actes du Séminaire européen Butor étoilé : quels apports pour la connaissance de l'espèce et la gestion des marais à roselières ? Programmes de conservation et de recherche / 10-12 décembre 2004, Angerville l'Orcher, Seine-Maritime

55 pages 2005 Consultable : Pôle Relais Tourbières

PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O. et al.

Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux

114 pages 1996 Consultable : Pôle Relais Tourbières

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

RUFRA Y X., RUFRA Y V., C RAMM P.

L'hivernage de la Guifette moustac (Chlidonias hybridus) en France continentale, période 1973-1996

p 3 pages 1998 Consultable : CORA Région

SCHRICKE V.

Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula

99 pages 1998 Consultable : ONCFS

SOBERCO ENVIRONNEMENT, AZOR

Réserve de Biterne - deuxième plan de gestion

35 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

TROTTIGNON J.

Le butor, la carpe et le roseau : ou comment favoriser la vie des étangs.


pages 1991 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090047



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)