



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42090055

Ancien N° régional : 42022122

Etang de Lachaud

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 15,58 ha

Loire

CHALAIN-LE-COMTAL, GREZIEUX-LE-FROMENTAL

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. L'altitude moyenne est de 360 m. La topographie, entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais, entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans la plaine, où elles alimentent la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L'abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création d'étangs pour la pisciculture. Aujourd'hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez, représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. Au sud-ouest de Montrond-les-Bains, l'étang de Lachaud est isolé au milieu d'une zone dite de "chaninats" aux sols maigres, voués à une activité agricole extensive. Cet étang présente la particularité d'abriter une colonie de Guifette moustac, oiseau proche des sternes et qui se nourrit de petits poissons et d'insectes capturés en vol. Parmi les anatidés, le Canard chipeau et le Fuligule milouin nichent sur cet étang. La très rare Sarcelle d'été, dont le mâle est reconnaissable à son large sourcil blanc, y élève aussi sa nichée. Quant au Grèbe à cou noir, il est sans doute parmi les plus beaux oiseaux des étangs, sa tête noire est ornée d'un œil rouge et d'un masque de plumes doré. S'agissant de la flore, on peut mentionner la présence de deux espèces végétales rares et protégées en région Rhône-Alpes : la Naiade marine et l'Oseille maritime. Ce dernier se reconnaît notamment à ses verticilles floraux denses, jaune or à maturité.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Naïade marine	<i>Najas marina</i> L.
Patience maritime (Oseille maritime)	<i>Rumex maritimus</i> L.

Faune vertébrée

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GALTIER J.

Contribution à la connaissance de la flore du Forez (Loire)
218 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Marsileaceae et Azollaceae dans la plaine du Forez (Loire)
309 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GUILLERME N., CHAVAS G., GUENEAU S.

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés dans le cadre du programme "étangs de la Loire".
34 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

PERENNOU C., SADOUL N., PINEAU O. et al.

Gestion des sites de nidification des oiseaux d'eau coloniaux
114 pages 1996 Consultable : Pôle Relais Tourbières

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.
67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes


RUFRAY X., RUFRAY V., CRAMM P.

L'hivernage de la Guifette moustac (Chlidonias hybridus) en France continentale, période 1973-1996
p 3 pages 1998 Consultable : CORA Région

SCHRICKE V.

Un plan de gestion pour la sarcelle d'été Anas querquedula. A management plan for the garganey Anas querquedula
99 pages 1998 Consultable : ONCFS

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42090055



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)