



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42100004

Ancien N° régional :

Bois de Pulchère et rivière Coise

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 218,16 ha

Loire

CHAZELLES-SUR-LYON, SAINT-MEDARD-EN-FOREZ

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	0	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 12

Description et intérêt du site

La Coise prend sa source à près de 900 m d'altitude dans les monts du Lyonnais, en limite des départements de la Loire et du Rhône. Le secteur décrit se compose de quelques méandres de la Coise ainsi que d'une partie des territoires boisées qui entourent la rivière. Plusieurs ruisseaux descendent des collines proches. Il reste des ruines d'anciens moulins le long de la rivière. La zone est constituée de plusieurs versants et est en partie composée de grand bois, de prés avec des haies. L'intérêt naturaliste de ce secteur est surtout faunistique ; les espèces présentes sont liées aux bords de rivière comme la Bergeronnette des ruisseaux et aux milieux forestiers et de bocage. Le Sonneur à ventre jaune se reproduit sur ce site, dans des flaques d'eau temporaires. Ce crapaud, au ventre jaune ponctué de noir hiberne d'octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans la terre humide. Lorsqu'il quitte ses quartiers d'hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites mares ou des ornières forestières dans lesquelles il va se reproduire. Sa longévité peut atteindre une trentaine d'années. L'Aeschne paisible est une grande libellule, présente le long de la Coise. Dans le bois de Pulchère, le Faucon hobereau et l'Autour des palombes se reproduisent ainsi que le cortège d'oiseaux forestiers (Pic noir, Grive musicienne, mésanges...). La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), avec deux couples au moins, et la Huppe fasciée habitent les haies et utilisent les prés du site pour se nourrir. L'Effraie et le Hibou moyen-duc, nicheurs à proximité, viennent chasser la nuit les micro-mammifères.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune *Bombina variegata*

Oiseaux

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Canard souchet *Anas clypeata*

Chouette chevêche *Athene noctua*

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Huppe fasciée *Upupa epops*

Faune invertébrée

Libellules

Aeschna paisible *Boyeria irene*

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42100004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)