



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU QUOTIDIEN DURABLE
Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42100006

Ancien N° régional :

Bocage de Lapra

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 23,95 ha

Loire

SAINT-BONNET-LES-OULES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

Description et intérêt du site

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. Sur la bordure est de la plaine du Forez, la zone décrite ici marque la limite avec les monts du Lyonnais. Le village de Saint-Bonnet-les-Oules se trouve au pied de ceux-ci, le territoire de cette commune s'étageant de la plaine jusqu'aux premières pentes. Le paysage est bocager avec des prairies délimitées par des haies. Ce milieu est habité par deux hôtes typiques du bocage : la Huppe fasciée et la Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna). La première compte parmi les plus beaux oiseaux de nos campagnes. Sa longue huppe, son long bec et son plumage jaune-beige avec les ailes et la queue noires et blanches font penser à un oiseau exotique. Elle capture les insectes au sol et sous les pierres et choisit un arbre creux pour élever ses jeunes. La Chouette chevêche est un petit rapace nocturne guère plus gros qu'un merle. Elle se nourrit des micro-mammifères et de gros insectes. C'est le seul rapace nocturne que l'on peut voir s'activer de jour. On peut également la voir perchée à l'entrée de sa cavité dans un arbre creux ou un trou de mur.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

PONT L.

Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42100006



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)