



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 42100007

Ancien N° régional : 42272201

## Etang de Lapra

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 9,20 ha

Loire SAINT-BONNET-LES-OULES

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 2 | Amphibiens | 0 | Reptiles   | 0 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 0 |            |   | Libellules  | 0 |
| Végétaux supérieurs | 3 | Oiseaux    | 0 | Crustacés  | 0 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 0 | Poissons   | 0 | Mollusques | 0 | Papillons   | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 1

### Description et intérêt du site

L'étang de Lapra appartient à la "plaque" sud des étangs de la plaine du Forez. Il est situé à 409 m d'altitude, au pied des monts du Lyonnais et à proximité d'agglomérations importantes dont celle d'Andrézieux-Bouthéon. Cet étang est réservé à des activités de pêches et de loisirs. Il est en grande partie recouvert de Nénuphar blancs. Son intérêt naturaliste principal réside néanmoins dans la présence, sur la partie ouest du site, d'un des plus grands "treublants" de la plaine du Forez, qui prolonge la zone d'eau libre de l'étang. On observe en bordure la plus importante des trois stations de Grande douve du département de la Loire. Cette plante, protégée en France, est reconnaissable à ses feuilles étroites pouvant atteindre vingt cinq centimètres et à sa hauteur imposante, dépassant souvent un mètre. La plus grande de nos renoncules a de grandes fleurs jaune vif ; elle est en régression partout en France. Dans la prairie humide située à proximité, a été observé l'Oenanthe à feuilles de peucedan. Cette plante est également en régression en région Rhône-Alpes. Ses fleurs blanches en ombelles s'épanouissent en juillet-août. C'est dans le même secteur qu'a été localisé l'Œillet superbe, espèce qui n'a malheureusement plus été retrouvée depuis plusieurs années.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Renoncule Langue (Grande douve) *Ranunculus lingua L.*

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### FRAPNA Loire

*Aménagement et mise en valeur des bords du fleuve Loire*

34 pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### PONT L.

*Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.*

67 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°42100007



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)