



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 42120001

Ancien N° régional :

Landes et prairies de Chénieux et des Sagnes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 52,58 ha

Loire SAINT-ETIENNE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

Non loin du site exceptionnel des Gorges de la Loire, le secteur des Sagnes et de Chénieux présente des milieux ouverts variés favorables à des oiseaux remarquables. Le paysage environnant est composé de prairies, cultures, landes, haies et boisements dans les secteurs les plus pentus. Cette zone est essentiellement composée de landes à Ajonc nain, de prairies et de zones rocheuses. Le crêt situé à 641 m d'altitude et son versant correspondent aux landes. Elles sont colonisées par divers ligneux dont les pins, les sorbiers, les genêts, ... Aucune espèce botanique remarquable n'y a été recensée. Ces milieux sont toutefois des lieux de prédilection pour certains oiseaux. On retrouve ici le Bruant proyer, le plus grand bruant d'Europe. Il affectionne les milieux ouverts où l'on peut souvent l'observer perché sur un buisson, un fil ou un piquet. Son vol lourd avec des ailes larges arrondies rappelle l'Alouette des champs, également présente. Ces milieux sont aussi occupés par la Pie-grièche écorcheur. Elle aime ces espaces ouverts parsemés de buissons et de fourrés. D'un perchoir dégagé, elle s'envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épinettes des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger. Cet oiseau migrateur n'est présent dans nos contrées que de mai à septembre. Ces landes présentent également un intérêt pour la Huppe fasciée et l'Engoulevent d'Europe. Ce dernier se rencontre préférentiellement dans les landes bien exposées. Cet oiseau, invisible pendant la journée, peut être entendu, au crépuscule. Il est présent, en France, d'avril à septembre, et hiverne au sud du Sahara. Il est plus fréquent dans le sud de l'hexagone et se reproduit sporadiquement sur l'ensemble du territoire. Il a la particularité de pondre ses œufs à même le sol sur un tapis de feuilles mortes. D'autres oiseaux remarquables ont été notés sur cette zone au cours d'écoutes par IPA (indice ponctuel d'abondance). Il s'agit de La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), du Busard Saint-Martin, du Milan noir, de la Mouette rieuse et du Héron cendré. Ces deux dernières espèces sont sans doute uniquement de passage, pour leur alimentation dans les prairies. Pour le Busard Saint-Martin, il s'agit d'un dortoir hivernal.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.
La Chevêche d'Athéna : rapport 2005
20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CE3E
Document d'objectifs Gorges de la Loire
52 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CESAME
Etude faunistique et floristique des gorges de la Loire
24 pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CHENAUD B.
Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201763 "Gorges de la Loire"
70 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORBIN D.
Prospections entomologique et botanique 2005 du site Natura 2000 L12 des Gorges de la Loire
39 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central


COUDURIER C.
Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)
37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.
Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)
43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

SIMONNET E.
La chouette chevêche en campagne
p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

SMAGL
Suivi de milieux et études faunistiques et floristiques des gorges de la Loire (phase I & II)
1-6 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°42120001



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)