



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69000002

Ancien N° régional :

Boisements et prairies humides de la Goutte noire

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 57,28 ha

Rhône COURS-LA-VILLE, SAINT-VINCENT-DE-REINS, THEL

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Le site, dont l'altitude oscille entre 700 et 750 m, se situe de part et d'autre du CD 108 entre les Filatures et Cours-la-Ville. Essentiellement constitué de forêts et de landes humides, il accueille des espèces végétales remarquables caractéristiques de ces types de milieux. Au lieu dit "Goutte Noire", on peut observer une fougère particulière, la Fougère des montagnes, que l'on ne retrouve généralement qu'en forêt au climat humide, sur sol acide et dans des secteurs ombragés. De l'autre côté de la route départementale, à la source d'un affluent du Rheins (le ruisseau des Gouttes Noires), on remarque une tourbière à sphaignes, milieu naturel très sensible extrêmement rare dans le département du Rhône. Deux plantes sont particulièrement remarquables. La tourbière cache ainsi une petite potentille à fleurs rouges, typique des prairies tourbeuses et autres marais, et portant le joli nom de Comaret (ou Potentille des marais). Autre attrait de ce site, la Wahlenbergie (ou Campanille) à feuilles de lierre, du nom d'un botaniste suédois du dix-huitième siècle, G. Wahlenberg à qui elle a été dédiée. Plante également typique des prairies acides, cette campanulacée possède la particularité de ne pouvoir être observée que sur des secteurs fortement influencés par le climat atlantique (caractérisé entre autres par des hivers doux). Le département du Rhône étant déjà nettement marqué par l'influence continentale, cette espèce trouve ici ses stations les plus orientales.

Milieus naturels

51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Fougère des montagnes *Oreopteris limbosperma* (All.) Holub
Campanille à feuilles de Lierre *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reichenb.
(Wahlenbergie à feuilles de lierre)

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

MUNOZ F.

Note sur la présence de Wahlenbergia hederacea Reich. dans le Haut-Beaujolais (Est du Massif central, France)

177 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Un taxon critique et remarquable du Haut-Beaujolais, Circaea x intermedia Ehrh. (Myrtales, Onagraceae)

1-9 pages 2007 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.

Flore lyonnaise


623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°6900002



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)