



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69000005

Ancien N° régional :

Prairies de Pusignan

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 437,48 ha

Rhône COLOMBIER-SAUGNIEU, GENAS, MEYZIEU, PUSIGNAN

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 0 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux sucoériers | 0 | Oiseaux | 3 | Crustacés | 0 | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | 0 | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 12

Description et intérêt du site

L'est lyonnais est très souvent caractérisé par des plaines céréalières, notamment celle de Meyzieu, Genas et Pusignan. Ici les parcelles de plusieurs dizaines d'hectares sont séparées, de temps en temps, par de petites haies. L'ensemble se développe, comme la majeure partie de l'agrosystème local, sur des cailloutis calcaires superficiels (issus de moraines datées de la glaciation du Riss) mélangées avec des sables limoneux fins (résultat de la dégradation de moraines plus récentes, datées du Würm. Quatre à cinq couples de Bruant ortolan sont ici présents attestant d'une ambiance locale chaude et sèche. Une petite parcelle de prairie de fauche accueille une dizaine de chanteurs de Bruant proyer. Rares sont les sites dans le département où ces deux espèces sont présentes de manière simultanée. L'Oedicnème criard, dont plus de six couples sont présents sur les parcelles de production comme le maïs et le tournesol, fréquente ces terres dès le mois d'avril. La plaine à également ses barons, les Busards cendrés, dont sept couples ont été observés en 1991, se reproduisant avec difficulté. Ces rapaces rasant les céréales à la recherche de campagnols. Cette vaste plaine accueillait récemment encore le Courlis cendré et jadis l'Outarde canepetière. Ces espèces, sensibles aux perturbations, recherchent en effet les espaces ouverts diversifiés.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud calamite *Bufo calamita*

Mammifères

Lièvre d'Europe *Lepus europaeus*

Oiseaux

Edicnème criard *Burhinus oedicnemus*

Busard cendré *Circus pygargus*

Caille des blés *Coturnix coturnix*

Bruant proyer *Miliaria calandra*

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Courlis cendré *Numenius arquata*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°69000005



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)