Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **69000020**

Ancien N° régional : 69112204

Landes de Chassagne et de Servigny

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 84,71 ha

Rhône MESSIMY, THURINS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	3	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **17**

Description et intérêt du site

Cette zone agricole diversifiée est typique de l'ouest lyonnais. Elle marque la limite entre les zones naturelles des coteaux de l'ouest lyonnais et des monts du Lyonnais. L'agriculture se développe sur un sol colluvionnaire grossier, résultant de la décomposition du granit, roche-mère classique des monts du LyonnaisCaractéristique de l'étage collinéen entre 300 et 600 m d'altitude, elle englobe des boisements et des landes. En direction du sommet, des pinèdes de Pin sylvestre à sous-bois de châtaigniers alternent ainsi avec des landes à Genêt à balais. Elles tendent à se réduire, car elles sont remplacées par des vergers de cerisiers. En bas de versant, le paysage change. Les parcelles sont plus grandes, et l'arboriculture laisse la place aux céréales, labours et prairies pâturées. Ca et là quelques friches renforcent encore sa diversité. L'intérêt écologique est lié à la diversité des milieux créés et entretenus par l'activité agricole, qui privilégie la polyculture-élevage. Il en résulte une richesse spécifique animale, en particulier en amphibiens et en oiseaux. Plusieurs mares et ruisseaux sont favorables aux amphibiens. Parmi ces espèces, il est utile de mentionner la présence du Crapaud accoucheur et de la Grenouille agile, espèce qui apprécie les sous-bois humides, mais surtout du rare et localisé Triton crêté, dont la répartition et les effectifs restent très fragmentés dans le Rhône. Parmi les oiseaux, le peuplement est marqué par la présence d'espèces de milieux ouverts à forte affinité méridionale. Il est complété par la présence, non moins remarquable, d'espèces forestières ou appréciant les milieux plus fermés. En bas de versant, dans les prairies, friches et parcelles céréalières, l'Oedicnème criard peut être observé, au milieu d'une bonne densité de Bruant proyer et, à un degré moindre, de Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), petite chouette dont les effectifs sont en déclin local et régional. Ca et là, l'Alouette des champs et la Huppe fasciée font entendre leur chant, surtout dans les vergers ou à proximité des maisons. Sur le haut du versant, on remarque la présence de l'Engoulevent d'Europe, insectivore, qui apprécie les parcelles de landes. C'est là que l'on observe aussi le Busard Saint-Martin, qui peut être rencontré toute l'année ici, se reproduit dans les coupes forestières et apprécie les parcelles de milieux ouverts pour rapporter des proies à ces jeunes. Cet ensemble, inscrit dans un relief aux formes douces et arrondies conserve une ambiance campagnarde attrayante à proximité immédiate de Lyon. L'agriculture traditionnelle favorise une diversité naturelle notable, notamment au contact de la forêt.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur	*Alytes obstetricans*
Grenouille agile	*Rana dalmatina*
Triton crêté	*Triturus cristatus*

Oiseaux

Chouette chevêche	*Athene noctua*
Œdicnème criard	*Burhinus oedicnemus*
Engoulevent d'Europe	*Caprimulgus europaeus*
Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*
Alouette lulu	*Lullula arborea*
Bruant proyer	*Miliaria calandra*
Huppe fasciée	*Upupa epops*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.
La Chevêche d'Athéna : rapport 2005
20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CORA
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.
Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)
37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.
Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)
43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

JACOB L.
Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NETIEN G.
Flore lyonnaise
623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PERRET N.
Dynamique de population en habitat fragmenté chez deux espèces d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et T. cristatus)
102 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

SIMONNET E.
La chouette chevêche en campagne
p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°69000020



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)