



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 69000047

Ancien N° régional :

Ruisseau de Nizy

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 20,92 ha

Rhône

LE BOIS-D'OINGT, MOIRE, OINGT, THEIZE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	2	Crustacés	2	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 2

Description et intérêt du site

Dans le secteur des coteaux calcaires du Beaujolais, les fonds de vallons plus ou moins encaissés sont boisés. Les hauts de versants sont par contre couverts de landes et de friches, et débouchent sur le vignoble. Entre Oingt et l'est du bois d'Oingt, le ruisseau de Nizy n'échappe pas à la règle. Au nord, quasiment dans le village, un bocage sec se développe. Dans cette zone périurbaine, les parcelles sont modestes et les friches ont la part belle. Les arbres isolés sont de belle taille et les versants tendent à se boiser. L'ensemble se développe sur des limons argilo-sableux ou sur un sol caillouteux peu profond issus de la dégradation du calcaire dur sur pentes faibles. Le secteur délimité est réduit, et la vallon très étroit. Le ruisseau dévale, ourlé d'une fine galerie forestière composée de chênes, de robiniers et de frênes ; ça et là quelques ormes résistent encore. Vif et clair, il fait alterner rapides et zones de calme. L'eau est de très bonne qualité. A l'arrivée dans le village d'Oingt, les nuances mordorées du bâti complètent le camaïeu de vert du paysage alentour. Dans cette ambiance rurale un cri rauque et bref s'élève du bocage sec. Perché sur un vieux chêne isolé, sa tête ronde et mouchetée de blanc tournant dans tous les sens, la Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) a déjà repéré le visiteur. Effarouchée par cette brutale apparition, elle préfère rejoindre de son vol ondulé la soupente éloignée d'une maison isolée dans laquelle elle disparaît. Le chant de l'eau fait se détourner le regard et très rapidement le fond du vallon est atteint. Dans l'eau fraîche et claire d'une zone de calme, une Ecrevisse à pattes blanches se déplace lentement. Plus loin d'autres observations confirment la présence d'une petite population. Les lieux conservent un paysage caractéristique coteaux du Beaujolais, atout local majeur nécessaire à la préservation des espèces remarquables qui les habitent.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Chouette chevêcheAthene noctua

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Crustacés

Ecrevisse à pattes blanchesAustropotamobius pallipes

Bibliographie

BALIAN C.

Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

42 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture

Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11septembre 2004 (volume 3)

pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FAURE J.P.

Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.

Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat

41 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRES P.

Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GROSSI J-L.

Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe

III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

VIERON J.P., FATON J.M.

Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme

8 p. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°69000047



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)