Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **69110002**

Ancien N° régional :

Prairies de Sainte Consorce

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 202,72 ha

Rhône CHARBONNIERES-LES-BAINS, MARCY-L'ETOILE, SAINTE-CONSORCE, SAINT-GENIS-LES-OLLIERES, TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **45**

Description et intérêt du site

Située au nord-ouest de Lyon, aux portes de l'agglomération, ce secteur plonge immédiatement le promeneur ou l'observateur dans une ambiance champêtre. Il s'agit d'une vaste plaine agricole, constituée de prairies, labours, parcelles de céréales qui sont entrecoupées de vergers de taille très réduite. La polyculture-élevage domine encore ce secteur, bien que les superficies en céréales et surtout en maïs tendent à augmenter. Cette prédominance de la polyculture permet l'existence précaire d'un réseau de haies lâches résiduel et de buissons isolés. Ca et là quelques bosquets de faibles superficies renforcent encore la diversité du paysage et l'ambiance rurale. Cette mosaïque se développe sur des sols allant de sablo-limoneux à argileux profonds formants des replats issus des granites des monts du lyonnais ou sur des alluvions hydromorphes profonds ayant la même origine et très favorable à l'agriculture. Dans les labours et les chaumes de maïs un oiseau très mimétique essaie de s'échapper, en se plaquant au sol ou en "piétant", à l'observateur qui a réussi à la repérer non sans difficulté. Il appartient à l'un des quatre couples d'Oedicnème criard présents ici entre la mi-mars et la fin juillet. Bien qu'essayant chaque année de se reproduire, leur situation reste précaire puisqu'ils rencontre fréquemment des difficultés à conduire leur couvée à terme. Soudain, d'un verger proche, un cri rauque et profond s'échappe, puis quelques instants plus tard, un oiseau traverse le champ d'un vol ondulé. Il se pose sur le piquet d'une clôture, regardant dans notre direction. Ses yeux d'or et sa taille permettent d'identifier La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) dont il reste ici une petite population au statut fragile. Plus loin des "oup, oup, oup" sonores et graves conduisent à rechercher quel est l'émetteur de ce chant si singulier. A proximité d'une habitation s'élance de son vol papillonnant caractéristique la Huppe fasciée, rappelant que cette zone chaude est encore riche en insectes. En mai-juin, les prairies sont remplies des trilles stridents des Bruants proyers, dont les quelques mâles résiduels qui persistent à chanter se perchent au sommet des arbres et buissons isolés ou dans les haies. Ils sont parfois accompagnés de la Pie-Grièche écorcheur qui empale les insectes sur les épines des prunelliers. Dans les bois quelques couples de Pigeon colombin se reproduisent de manière régulière. Le maintien d'une telle diversité en espèces remarquables passe ici par la pérennité de l'agriculture traditionnelle.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Ail des ours	*Allium ursinum L.*

Faune vertébrée

Mammifères

Lièvre d'Europe	*Lepus europaeus*
Noctule de Leisler	*Nyctalus leisleri*
Noctule commune	*Nyctalus noctula*
Pipistrelle de Nathusius	*Pipistrellus nathusii*
Pipistrelle commune	*Pipistrellus pipistrellus*

Oiseaux

Chouette chevêche	*Athene noctua*
Œdicnème criard	*Burhinus oedicnemus*
Engoulevent d'Europe	*Caprimulgus europaeus*
Pigeon colombin	*Columba oenas*
Bruant proyer	*Miliaria calandra*
Huppe fasciée	*Upupa epops*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

NETIEN G.

Complément à la flore lyonnaise

125 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SCAPPATICCI G.

Barlia robertiana, extension de l'aire en vallée du Rhône

13- pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°69110002



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)