



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73000004

Ancien N° régional :

Tourbière de Villarabout

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2,30 ha

Savoie

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Au nord des domaines skiables de Saint Martin de Belleville-Les Menuires et de Méribel-Les Allues, la Montagne de Cherferie, le Roc de Fer et le Dos de Crest-Voland présentent des richesses naturelles exceptionnelles. Le versant nord-est, relativement escarpé, est occupé par les landes à éricacées et par l'aulnaie à Aulne vert, domaines du Tétralyre et du Sizerin flammé. Sur les pentes douces du versant ouest, le paysage façonné par l'exploitation pastorale montre de vastes alpages, pelouses ou landes ; ils sont fréquentés par l'Alouette des champs, le Merle de roche, la Caille des blés. L'élément le plus remarquable reste néanmoins les tourbières qui parsèment ce versant. La tourbière de Villarabout est l'une d'entre-elles. C'est un marais tufeux qui correspond à des zones de résurgences d'eaux provenant des massifs karstiques environnants. Les eaux fortement chargées en carbonate de calcium précipitent en arrivant à l'air libre et forment des dépôts de calcaires appelés tufs. Les tufs sont ici associés à des "bas-marais" alcalins (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique). La Pie-grièche écorcheur fréquente le site. Buissons denses et de préférence épineux, espaces avec une végétation rase si possible bien exposés sont l'habitat de prédilection de cet oiseau. Un comportement tout à fait particulier consiste à empaler ses proies (gros insectes, petits mulots, lézards) sur les épines des arbustes, sur les fils de fer barbelés où elles seront ensuite dépecées. Cette tourbière s'inscrit discrètement dans un paysage très agréable de moyenne montagne, prairies fauchées et pâturées, lignes d'arbres, bosquets, arbres isolés.

Milieux naturels

54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Oiseaux	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée


Pas de données disponibles



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73000004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)