



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73000029

Ancien N° régional :

## Marais de Touchefeu

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 9,38 ha

Savoie

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN, LOISIEUX

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	1
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	1
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

### Description et intérêt du site

La zone humide de Touchefeu appartient à ces îlots reliques de "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins de l'Avant-Pays savoyard. Il s'agit d'une tourbière alcaline ; celles-ci se développent sur des sols riches en calcaire. Elles sont également appelées "tourbières plates" ou "tourbières basses". La tourbe qui s'y accumule est formée de nombreuses laïches mais aussi de mousses particulières : les hypnacées. Essentiellement développées dans les vallées alluviales et les Préalpes calcaires où l'influence des glaciers jurassiens et alpiens a été importante, elles représentent 55% de la surface des tourbières de la région. Ce sont essentiellement des tourbières de plaine. Les milieux naturels associés aux tourbières alcalines sont très variés. Il s'agit le plus souvent de prairies à forte diversité floristique : on remarque ainsi la présence de la Laïche paradoxale (ou Laïche à épis rapprochés). La faune des tourbières alcalines est de même assez riche. Elle comporte notamment plusieurs espèces de papillons en forte régression. La présence d'une "métapopulation" (ensemble formé par un groupe de populations discontinues) du papillon Damier de la Succise confirme tout l'intérêt de ce petit site.

## Milieus naturels

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Laïche paradoxale

*Carex appropinquata Schumacher*

## Faune invertébrée

### Papillons

Damier de la Succise

*Euphydryas aurinia*

## Bibliographie

### **BRAUD Y., SCHLEICHER J.**

*Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore*

12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### **Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie**

*Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -*

13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### **LAFRANCHIS J.**

*Le Damier de la Succise*

p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

### **LAFRANCHIS T.**

*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°7300029



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)