Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **73000079**

Ancien N° régional : 73000300

Bocage de Boige et de la Ramée

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 190,99 ha

Savoie CHALLES-LES-EAUX, LA RAVOIRE, MYANS, SAINT-JEOIRE-PRIEURE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **47**

Description et intérêt du site

Au cœur de la tache d'urbanisation qui progresse inexorablement dans la cluse de Chambéry, le secteur situé à l'ouest de Challes-les-Eaux et Saint-Jeoire-Prieuré fait figure d'îlot encore miraculeusement préservé. L'occupation du bassin versant (activité d'élevage dominante) reste actuellement très favorable au sud et à l'ouest, à l'exception d'une importante zone de remblai. Les activités agricoles y ont conservé un paysage diversifié de cultures, prairies, bosquets et lignes d'arbres : il accueille ainsi une des principales populations de Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) du département. Cette dernière trouve refuge dans les arbres creux d'alignement des haies. Elle se nourrit de gros insectes, de lombrics et de micro-mammifères qu'elle capture au sol. La Rousserolle verderolle, petite fauvette verdâtre au chant remarquable et très imitatif affectionne les groupements herbacés humides pour y nicher discrètement. La flore reste très riche ; la Gratiole officinale, aux fleurs proches de celles des gueules-de-Loup, est cependant en régression manifeste. De même, plusieurs espèces de grand intérêt n'ont plus été revues récemment : Gesse des marais, Renoncule scélérate. De belles orchidées comme l'Orchis odorant, l'Orchis à fleurs lâches ou l'Orchis des marais égayent de leur floraison rose vif le marais en été. On remarque aussi la présence de l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Véritable fossile vivant, cette petite fougère est plus fréquente dans les prairies humides. Il est aussi possible de la rencontrer dans des milieux plus secs (pelouses de coteaux calcaires par exemple) dans des régions à forte pluviosité. Son unique feuille est composée d'un limbe ovale et d'un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Les prairies humides de Boige sont le dernier site connu de la cluse de Chambéry pour la présence de deux papillons remarquables : l'Azuré de la sanguisorbe et l'Azuré des paluds. Deux libellules rares fréquentent aussi régulièrement le site : l'Aeschne printanière et la Cordulie à tâches jaunes. Les prairies restent majoritairement entretenues par fauche tardive annuelle ou biennale. Les secteurs en friche devraient faire l'objet de travaux de restauration dans le cadre du contrat de bassin versant du lac du Bourget. Notamment, le réseau d'anciens fossés de drainage serait ainsi progressivement neutralisé.

Milieux naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Faune vertébrée

Amphibiens

Grenouille agile	*Rana dalmatina*

Mammifères

Petit murin	*Myotis blythi*

Oiseaux

Rousserolle verderolle	*Acrocephalus palustris*
Chouette chevêche	*Athene noctua*

Flore

Cirse de Montpellier	*Cirsium monspessulanum*
Cirse de Montpellier	*Cirsium monspessulanum subsp. monspessulanum*
Gaudinie fragile	*Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.*
Gratiole officinale	*Gratiola officinalis L.*
Orchis odorant	*Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard*
Gesse des marais	*Lathyrus palustris L.*
Œnanthe de Lachenal	*Oenanthe lachenalii*
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	*Ophioglossum vulgatum L.*
Ophrys abeille	*Ophrys apifera Hudson*
Orchis à fleurs lâches	*Orchis laxiflora Lam.*
Orchis des marais	*Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens*
Renoncule scélérate	*Ranunculus sceleratus L.*
Séneçon aquatique	*Senecio aquaticus Hill*
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	*Silaum silaus*
Épiaire blanche	*Stachys germanica L.*
Trèfle beige	*Trifolium ochroleucon Hudson*

Faune invertébrée

Libellules

Aeschne printanière	*Brachytron pratense*
Cordulie à taches jaunes	*Somatochlora flavomaculata*

Papillons

Cuivré des marais	*Lycaena dispar*
Azuré des paluds	*Maculinea nausithous*
Azuré de la sanguisorbe	*Maculinea teleius*

Bibliographie

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 p pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

15 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 p pages Consultable : Parc National des Ecrins

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MIQUET A.

Document d'objectifs du réseau des zones humides dans la Combe de Savoie et la Moyenne vallée de l'Isère (site Natura 2000 S12 n° FR 8201773). Partie I : Description et analyse de enjeux et des problématiques de conservation

26 p pages 2005 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Document d'objectifs du réseau des zones humides dans la Combe de Savoie et la Moyenne vallée de l'Isère (site Natura 2000 S12 n° FR 8201773). Partie II : Présentation opérationn par sous-site

75 p pages 2005 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

MIQUET,A

Document d'objectifs du réseau des zones humides dans la Combe de Savoie et la Moyenne vallée de l'Isère (site Natura 2000 S12 n° FR 8201773)

pages 2005 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

ROUE S.Y., SEMPE M., BARATAUD M.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857

p 45 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

ROZIER Y.

Biologie de la conservation des Azurés (Maculinea sp.) dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours

32 p pages 1995 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi Maculinea - Marais des Bidonnes - été 1997

13 p pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Suivi scientifique du complexe Maculinea-Sanguisorba / Gentiana-Myrmica dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours - Rapport d'activité 1999

22 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 46 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 p pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes

42 p pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°73000079



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)