

ZONES HUMIDES DU SUD DE L'ALBANAIS

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 8 405 ha

Haute-Savoie

ALBY-SUR-CHERAN, BLOYE, CHAINAZ-LES-FRASSES, CUSY, HERY-SUR-ALBY, MARIGNY-SAINT-MARCEL, RUMILLY, SAINT-FELIX,

Savoie

ALBENS, LA BIOLLE, EPERSY, GRESY-SUR-AIX, MOGNARD, SAINT-GIROD, SAINT-OFFENGE-DESSOUS, SAINT-OFFENGE-DESSUS, SAINT-OURS,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

73050001,73050002,73050003,73050004,73050005,73050006,73050007,73050008,73050009,73050010,73050011,73050012,73050013,73050014,73050015,73050016,73050017,73050018,73050019

Description et intérêt du site

L'Albanais s'inscrit dans le sillon molassique qui ceinture à l'ouest les massifs subalpins, depuis la basse vallée du Rhône jusqu'à Genève (puis bien au-delà jusqu'à Vienne en Autriche...).

Formant un opulent « avant-pays », cette région constituait autrefois le grenier à blé de la Savoie.

L'ensemble décrit ici délimite le bassin versant d'un important réseau de zones humides subsistant dans le sud de l'Albanais, l'un des principaux ensembles de ce type subsistant en Savoie.

Il conserve des types d'habitats naturels remarquables (cladiaies), allant de pair avec un grand intérêt floristique (Laîche des bourniers, Dactylorhize de Traunsteiner et autres orchidées, Renoncule langue, Samole de Valerand...).

La faune est particulièrement bien représentée en ce qui concerne l'avifaune (ardéidés, fauvettes paludicoles, Courlis cendré...), les libellules (bien représentés ici), les batraciens (Rainette verte...).

Le zonage de type II traduit les multiples interactions existant au sein de cet ensemble dont les étangs, marais ou prairies humides les plus remarquables sont par ailleurs identifiés en autant de ZNIEFF de type I au fonctionnement fortement interdépendant.

Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles :

- celles de nature hydraulique (champ d'expansion naturelle des crues, auto-épuration des eaux),
- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées ;
- il traduit également le bon état de conservation général du bassin versant, en rapport avec le maintien de populations d'Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l'est de la vallée du Rhône.

Milieux naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.31	FORETS DE FRENES ET D'AULNES DES RUISSELETS ET DES SOURCES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Asaret d'Europe	Asarum europaeum L.
Laîche paradoxale	Carex appropinquata Schumacher
Laîche à deux étamines	Carex diandra Schrank
Laîche à fruits velus	Carex lasiocarpa Ehrh.
Laîche des tourbières	Carex limosa L.
Laîche des rives	Carex riparia Curtis
Orchis de Traunsteiner	Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó
Œillet superbe	Dianthus superbus L.
Œillet superbe	Dianthus superbus subsp. superbus
Rossolis à feuilles rondes	Drosera rotundifolia L.
Gratioline officinale	Gratiola officinalis L.
Orchis odorant	Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Gypsophile des murs	Gypsophila muralis L.
Ecuelle d'eau	Hydrocotyle vulgaris L.
Inule de Suisse	Inula helvetica Weber
Jonc aplati	Juncus anceps Laharpe
Nénuphar jaune	Nuphar lutea (L.) Sm.
Nénuphar blanc	Nymphaea alba L.
Œnanthe de Lachenal	Oenanthe lachenalii
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	Ophioglossum vulgatum L.
Orchis à fleurs lâches	Orchis laxiflora Lam.
Orchis des marais	Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens
Pédiculaire des marais	Pedicularis palustris L.
Peucedan des marais	Peucedanum palustre
Potamot plantain	Potamogeton coloratus Hornem.
Potentille des marais (Comaret)	Potentilla palustris (L.) Scop.
Renoncule Langue (Grande douve)	Ranunculus lingua L.
Groseiller rouge	Ribes rubrum L.
Saule rampant	Salix repens L.
Samole de Valerand	Samolus valerandi L.
Scorzonère peu élevée	Scorzonera humilis L.
Scrophulaire des ombrages	Scrophularia umbrosa Dumort.
Séneçon aquatique	Senecio aquaticus Hill
Séneçon des marais	Senecio paludosus L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	Silaum silaus
Fougère des marais	Thelypteris palustris Schott
Trèfle beige	Trifolium ochroleucon Hudson
Utriculaire négligée	Utricularia australis R. Br.
Utriculaire intermédiaire	Utricularia intermedia Hayne
Petite Utriculaire	Utricularia minor L.

Faune vertébrée

Amphibien	
Rainette verte	Hyla arborea
Grenouille agile	Rana dalmatina
Grenouille rousse	Rana temporaria

Oiseau	
Rousserolle turdoïde	Acrocephalus arundinaceus
Rousserolle verderolle	Acrocephalus palustris
Rousserolle effarvate	Acrocephalus scirpaceus
Hibou moyen-duc	Asio otus
Fuligule milouin	Aythya ferina
Tarin des aulnes	Carduelis spinus
Hirondelle de fenêtre	Delichon urbica
Pic épeichette	Dendrocopos minor
Bruant des roseaux	Emberiza schoeniclus
Faucon hobereau	Falco subbuteo
Foulque macroule	Fulica atra
Blongios nain	Ixobrychus minutus
Pie-grièche écorcheur	Lanius collurio
Locustelle tachetée	Locustella naevia
Milan noir	Milvus migrans
Courlis cendré	Numenius arquata
Bihoreau gris	Nycticorax nycticorax
Moineau friquet	Passer montanus
Grèbe huppé	Podiceps cristatus
Tarier des prés	Saxicola rubetra
Grèbe castagneux	Tachybaptus ruficollis
Huppe fasciée	Upupa epops

Faune invertébrée

Crustacé	
Ecrevisse à pattes blanches	Austropotamobius pallipes

Libellule	
Aeschna mixte	Aeshna mixta
Aeschna isocèle	Anaciaeschna isosceles
Anax napolitain	Anax parthenope
Aeschna printanière	Brachytron pratense
Agrion gracieux	Coenagrion pulchellum
Gomphus gentil	Gomphus pulchellus
Libellule fauve	Libellula fulva
Agrion à pattes larges	Platynemis pennipes
Cordulie à taches jaunes	Somatochlora flavomaculata
Sympetrum jaune	Sympetrum flaveolum

Papillon	
Cuivré des marais	Lycena dispar

Bibliographie

Site susceptible d'être reconnu d'importance communautaire n° FR 8201772 : réseau des zones humides dans l'albanais, document d'application, marais des Villards (La Biolle), marais du Parc (La Biolle), marais de Chevilly (Grésy sur Aix), marais d'Epersy-M

pages : Consultable : Conservatoire du Patrimoine naturel de la Savoie

BOISSIER, J.M.

Guide d'interprétation des habitats naturels du massif des Bauges

2005 pages : 132p. Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

BOURON, M.

Document d'objectifs du réseau de zones humides de l'Albanais (FR 8201772). Description et analyse des enjeux et des problématiques de conservation. Décembre 2004

2004 pages : Consultable : Conservatoire du Patrimoine naturel de la Savoie

MERLE, H.


Cartographie des habitats du Parc Naturel Régional des Bauges

2005 pages : 3p.+a Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin


Parc Naturel Régional des Bauges

Etude piscicole du Chéran - rapport de synthèse

2003 pages : 15 p. Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF II* N°7305



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1



fonds IGN Scan 100 (C)