



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73080006

Ancien N° régional :

Tourbière du Lata du Vaz

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1,70 ha

Savoie VILLARD-SUR-DORON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 130

Description et intérêt du site

Le massif du Beaufortain constitue le prolongement méridional du Mont Blanc. Massif cristallin à l'altitude peu élevée (moins de 3000 m), ses formes douces rendent la découverte des milieux naturels très aisée. Le Beaufortain abrite nombre de richesses insoupçonnées, à l'image de cette petite zone humide d'altitude nichée au milieu des forêts. En effet, les rives tourbeuses du plan d'eau favorisent la présence d'une flore et d'une faune inféodées aux milieux humides. Citons notamment deux oiseaux fréquentant les berges et les peuplements d'aulne vert alentours. Le Tétraz lyre vit en limite supérieure de forêt. Au printemps, les montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des arènes, territoires sur lesquels se déroulent les danses. Le mâle dominant occupe l'arène centrale qu'il a obtenue après combat avec ses rivaux. Très sensible aux dérangements dus au développement du tourisme hivernal, il préfère des milieux plus ouverts et tranquilles. Quant au Sizerin flammé, il vit dans les zones semi-ouvertes faisant la transition entre la forêt et les alpages ; ce sont des zones dans lesquelles alternent résineux rabougris adoptant des formes de bonzaï et prairies ou dalles rocheuses nues : on les appelle les "zones de combat". Mais la principale richesse du site est la présence de plusieurs espèces de libellules remarquables. On rencontre ainsi cinq espèces de libellules sur ce territoire. L'Agrion hasté est une espèce qui trouve sa limite d'extension en Europe occidentale ; en France, elle est localisée à certains massifs montagneux et affectionne les tourbières avec une présence d'eau libre. La Leucorrhine douteuse est elle aussi inféodée aux tourbières et inscrite sur la liste rouge régionale des espèces menacées. On rencontre aussi l'Aesche des joncs, espèce des montagnes d'altitude moyenne et des Alpes affectionnant les eaux tourbeuses et menacé par la destruction des tourbières. Enfin le Sympétrum noir et des cordulies sont les hôtes très intéressantes de ce lieu. Le Lata du Vaz apparaît ainsi comme un site odonatologique majeur pour les Alpes françaises ; il est fort probable qu'il alimente les tourbières voisines en espèces rares (Sympétrum noir, cordulies et Leucorrhine douteuse).

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Sizerin flammé

Carduelis flammea

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73080006



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)