



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73090013

Ancien N° régional : 73492808,73492806,73492807

Vallée de la Grande Maison

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 4 038,07 ha

Savoie AIME, BEAUFORT, CEVINS, FEISSONS-SUR-ISERE, GRANIER, LA LECHERE

Niveau de connaissance

Milieus naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 44

Description et intérêt du site

Le site comprend la vallée de la Grande Maison mais plus largement tout le bassin versant du torrent de Glaize de 500 à 2500 m d'altitude. Il englobe également les versants ouest de la Grande Pointe de Bizard, et le versant sud-est du Roc Marchand dominant la vallée voisine de Grand Naves. Il illustre une grande diversité d'habitats naturels et d'espèces :- le pied de versant dominant la vallée de l'Isère est marqué par les affleurements rocheux, les falaises et les forêts thermophiles (recherchant la chaleur) ; on y observe le Faucon pèlerin et, en matière de flore remarquable, le Sabot de vénus,- les forêts fraîches de l'étage subalpin (pessières principalement) abritent la Clématite des Alpes ou le Lycopode en massue,- les pâturages et mégaphorbiaies (formations à hautes herbes) du fond de vallée de la Grande Maison hébergent une flore remarquable, avec la Stemmakanthe rhapsodique ou la Céphalaire des Alpes,- les landes supra forestières : brousses à Aulne vert du versant nord du roc Marchand, ou à rhododendron de la Croix de Sècheron et du versant sud-est de la pointe de Comborsier, constituent le biotope d'oiseaux tels que le Tétraz Lyre et le Sizerin flammé,- les pelouses et rochers de l'étage alpin abritent le Merle de roche ou le Lagopède alpin, ou des plantes comme la violette de Thomas ou la Luzule penchée. Aigle royal et Crave à bec rouge, qui nichent en falaise, sont ici réguliers. Plusieurs lacs, mares, et petits marais de pente apportent un élément supplémentaire de diversité avec leur cortège de libellules, d'amphibiens, et la flore des milieux humides.

Milieus naturels

31.42	LANDES A RHODODENDRON
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

Flore

Faux alysson renflé	<i>Alyssoides utriculata (L.) Medik.</i>
Céphalaire des Alpes	<i>Cephalaria alpina (L.) Roemer & Schultes</i>
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina (L.) Miller</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger (L.) Bernh.</i>
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.</i>
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum (L.) Swartz</i>
Luzule penchée	<i>Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve</i>
Lycopode en massue	<i>Lycopodium clavatum L.</i>
Gnaphale de Norvège	<i>Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S</i>
Orobanche du lierre	<i>Orobancha hederæ Duby</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i>
Silène arméria	<i>Silene armeria L.</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Rhapontique des Alpes (Stemmacanthe rhapontique)	<i>Stemmacantha rhapontica (L.) Dittr.</i>
Rhapontique de Lamark	<i>Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittr.</i>
Stipe chevelue	<i>Stipa capillata L.</i>
Tozzie des Alpes	<i>Tozzia alpina L.</i>
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum L.</i>
Trèfle strié	<i>Trifolium striatum L.</i>
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana Song. & Perr.</i>

Bibliographie

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Mammifères



Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
-------------	-----------------------

Oiseaux

Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Faune invertébrée



Pas de données disponibles



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy