



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73090015

Ancien N° régional : 73492808,73492809,73492807

Cormet d'Arèches

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Savoie AIME, BEAUFORT, GRANIER, LA COTE-D'AIME, LA LECHERE

Surface : 2 448,32 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	1
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **168**

Description et intérêt du site

Le Cormet d'Arèches est un lieu de passage historique entre la vallée de la Tarentaise et le massif du Beaufortain vers la Haute-Savoie. Au Cormet proprement dit, de nombreuses petites zones humides montrent des cortèges floristiques variés en fonction du stade évolutif de ces zones humides. On rencontre des dépressions inondées à Laïche des bourniers mais aussi des "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à Jonc à trois glumes et Jonc arctique, une très rare relique glaciaire. Dans les secteurs où des étendues d'eau libre persistent se reproduit le Triton alpestre. Les landes fraîches sont parsemées des buissons caractéristiques du Saule glauque tandis que dans les secteurs plus secs, parmi les éricacées, rampent les tiges du Lycopode des Alpes. Falaises et rochers sont le domaine des oiseaux symboliques des montagnes : le coloré Merle de roche, le Crave à bec rouge et l'Aigle royal, dont un couple se reproduit chaque année dans le vallon du torrent du Cormet d'Arèches.

Milieus naturels

31.44	LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
61.2	EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore

Laïche des tourbières	<i>Carex limosa</i> L.
Orchis rouge sang	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Müller) Soó
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub
Épervière (Piloselle) en cyme	<i>Hieracium cymosum</i> L.
Jonc arctique	<i>Juncus arcticus</i> Willd.
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum</i> var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers.
Luzule penchée	<i>Luzula nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve
Lycopode en massue	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
Pédiculaire tronquée	<i>Pedicularis recutita</i> L.
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.
Cresson d'Islande	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunn.) Borbás
Saule à feuilles de myrte	<i>Salix breviserrata</i> B. Flod.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Scrophulaire des ombrages	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana</i> Song. & Perr.

Faune vertébrée

Amphibiens

Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Reptiles


Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>
-----------------	-------------------------

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy