



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73150012

Ancien N° régional : 73380006

L'Aiguille Rousse

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 030,88 ha

Savoie PEISEY-NANCROIX

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 1 | Amphibiens | 1 | Reptiles | 1 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 1 | | | Libellules | 1 |
| Végétaux sucoérieurs | 2 | Oiseaux | 2 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 1 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 1 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 35

Description et intérêt du site

La partie haute de la Tarentaise est une vallée contrastée, tant par ses reliefs que par la complexité de ses climats. Le site de l'Aiguille Rousse domine le village de Peisey-Nancroix en exposition ensoleillée. La juxtaposition de forêts, de rochers abrupts et d'alpages crée un terrain favorable à un cortège floristique et faunistique très intéressant. La flore alpine compte quelques espèces qui ont retenu notre attention. Protégée en France, l'Ancolie des Alpes se remarque facilement par ses tiges florales très peu feuillées et ses fleurs d'un bleu vif, de grande taille (cinq à huit centimètres) et à éperon droit ou arqué. Espèce de demi-ombre des prairies d'altitude et aulnaies à Aulne verts, cette endémique des Alpes occidentales préfère les sols humides et calcaires. Attention aux prélèvements pour les bouquets qui déciment par endroits ses populations. La primevère du Piémont, elle aussi protégée en France, se développe sur les vires et fentes des parois rocheuses, principalement sur gneiss et quartzites ou pelouses écorchées. Pubescente et à glandes rougeâtres, la plante porte une inflorescence en ombelle de fleurs d'un rouge pourpré à gorge blanche non farineuse. Les falaises du site, associées aux forêts et aux alpages, servent de gîte à plusieurs espèces d'oiseaux d'intérêt. Ainsi, Crave à bec rouge, Faucon pèlerin et Merle de roche profitent des nombreuses vires rocheuses pour nicher et s'alimenter, tandis que l'Aigle royal survole régulièrement la zone, en quête de sa nourriture.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Perdrix bartavelle | <i>Alectoris graeca</i> |
| Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> |
| Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> |
| Merle de roche | <i>Monticola saxatilis</i> |
| Crave à bec rouge | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> |

Flore

| | |
|---------------------------------|--|
| Achillée musquée | <i>Achillea moschata</i> Wulfen |
| Ancolie des Alpes | <i>Aquilegia alpina</i> L. |
| Arabette bleuâtre | <i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke |
| Génépi noir | <i>Artemisia genipi</i> |
| Orchis nain | <i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard |
| Racine de corail | <i>Corallorrhiza corallorrhiza</i> (L.) Karsten |
| Lycopode des Alpes | <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub |
| Tête de dragon de Ruysch | <i>Dracocephalum ruyschiana</i> L. |
| Orchis odorant | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard |
| Bardanette réfléchie | <i>Lappula deflexa</i> (Lehm.) Cesati |
| Listère à feuilles cordées | <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. |
| Minuartie de Villars | <i>Minuartia villarii</i> (Balbis) Wicz. & Chenevard |
| Pyrole à une fleur | <i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray |
| Pédiculaire du Mont Cenis | <i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin |
| Primevère du Piémont | <i>Primula pedemontana</i> Gaudin |
| Pyrole intermédiaire | <i>Pyrola media</i> Swartz |
| Saxifrage bleuâtre | <i>Saxifraga caesia</i> L. |
| Saxifrage fausse mousse | <i>Saxifraga muscoides</i> All. |
| Stipe pennée (Plumet, Marabout) | <i>Stipa pennata</i> L. |
| Violette de Thomas | <i>Viola thomasiana</i> Song. & Perr. |

Faune invertébrée

Papillons

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Damier de la Succise | <i>Euphydryas aurinia</i> |
|----------------------|---------------------------|

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DARINOT F.

Massif de la Vanoise. Site n°32. I. Document d'objectifs Natura 2000. II. Fiches descriptives habitats et espèces d'intérêt communautaire

2 vo pages 1998 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Parc National de la Vanoise

Atlas du Parc national de la Vanoise

64 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

