Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **73150052**

Ancien N° régional : 73080011,73080010

La Sassière de Sainte Foy

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 240,83 ha

Savoie MONTVALEZAN, SAINTE-FOY-TARENTAISE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **30**

Description et intérêt du site

Moins connue que la célèbre réserve naturelle de la grande Sassière à Tignes, la Sassière de Sainte-Foy n'en demeure pas moins un espace exceptionnel pour la flore et la faune alpine. Le substrat géologique de ce secteur est dominé par des roches acides. Cette caractéristique explique la présence de l'Androsace alpine dans les éboulis. Les anciennes moraines glaciaires sont recouvertes par des étendues de landes à éricacées où le Lycopode alpin est bien représenté. Quelques plantes parmi les plus rares de France sont également connues dans ce vallon : la Pédiculaire tronquée, présente en France uniquement en Savoie et Haute-Savoie et le Saule helvétique, présent seulement dans quatre départements alpins. La station de Saule helvétique du vallon de la Sassière de Sainte-Foy est la plus importante de Savoie par son étendue et le nombre d'individus. La faune alpine vertébrée est typique, à souligner l'abondance de populations de Merle de roche sur les versants exposés au sud. Dans le contexte très aménagé de la Haute Tarentaise, le vallon de la Sassière de Sainte-Foy témoigne de la richesse et de la diversité du patrimoine naturel des zones de montagne.

Milieux naturels

31.432	FOURRES A JUNIPERUS SABINA
31.44	LANDES A EMPETRUM ET VACCINUM
61.1	EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES

Faune vertébrée

Oiseaux

Merle de roche	*Monticola saxatilis*

Flore

Achillée musquée	*Achillea moschata Wulfen*
Androsace des Alpes	*Androsace alpina (L.) Lam.*
Chou de Richer	*Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet*
Cortuse de matthioli	*Cortusa matthiolii L.*
Lycopode des Alpes	*Diphasiastrum alpinum (L.) Holub*
Jonc à trois glumes	*Juncus triglumis L.*
Gnaphale de Norvège	*Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S*
Pédiculaire du Mont Cenis	*Pedicularis cenisia Gaudin*
Pédiculaire tronquée	*Pedicularis recutita L.*
Pédiculaire de Suisse	*Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica (Steininger) O. Schwarz*
Grassette à éperon étroit	*Pinguicula leptoceras Reichenb.*
Sagine glabre	*Sagina glabra (Willd.) Fenzl*
Saule glauque	*Salix glaucosericea B. Flod.*
Saule helvétique	*Salix helvetica Vill.*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Etude hydrobiologique : lacs de Ste Foy et du Vallon du Clou

10 p pages Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°73150052



73150052

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 1/1

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)