



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73170009

Ancien N° régional : 73002200,73500008,73500012

Ripisylves de Bessans

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Savoie

BESSANS, LANSLEVILLARD

Surface : 228,37 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 129

Description et intérêt du site

Le site de Bessans se caractérise, à 1700 m environ, par une vallée large et plane, modelée par l'érosion glaciaire. Ces caractéristiques topographiques sont à l'origine des deux grands types d'habitats naturels qui en font l'intérêt biologique :

- les prairies de fauche qui occupent l'essentiel des terrains plats,
- d'autre part l'Arc et l'espace relativement large où divague le cours d'eau.

Pratiquement tous les stades d'évolution des milieux riverains peuvent être observés le long de celui-ci, des graviers nus à l'aulnaie à Aulne blanc en passant par les groupements de saules. L'avifaune est représentée ici par des espèces typiques telles que le Sizerin flammé, la Rousserolle verderolle, l'Accenteur mouchet ou la Fauvette des jardins.

Milieux naturels

24.223	BROUSSAILLES DE SAULES ET DE MYRICAIRE GERMANIQUE
38.3	PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
42.33	FORETS OCCIDENTALES DE MELEZES DE PINS DE MONTAGNE ET D'AROLLES

Flore

Campanule du Mont Cenis	<i>Campanula cenisia L.</i>
Cirse faux helenium	<i>Cirsium heterophyllum</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Choin ferrugineux	<i>Schoenus ferrugineus L.</i>

Faune vertébrée



Amphibiens	
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Mammifères	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Oiseaux	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Agriion à pattes larges	<i>Platycnemis pennipes</i>

Bibliographie


BROYER J.
Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)
15 p pages 2002 Consultable : ONCFS



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy