



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74000059

Ancien N° régional : 74440000,74780000,74770000,74920000

La Dranse, du pont de Bioge au lac Léman

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie ARMOY, FETERNES, LYAUD, PUBLIER, LA VERNAZ, THONON-LES-BAINS

Surface : 932,29 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 136

Description et intérêt du site

C'est au pont de Bioge, marquant la limite amont de ce secteur, que se joignent les eaux des deux Dranses de Morzine et de Châtel, ainsi que celles du Brevon, pour former la Dranse proprement-dite. Après plusieurs kilomètres en gorges, celle-ci s'élargit en aval du pont de la Douceur, se resserre dans la traversée de l'agglomération de Thonon à partir de Vongy, puis s'étale de nouveau pour former son delta lacustre. Deux sites distincts sont à considérer : - celui des gorges en amont, aux versants boisés (hêtraie, chênaie, pinède) et rocheux, abritant entre autres espèces le Grand-duc d'Europe, ainsi qu'un cortège de plantes particulières dont deux rarissimes : l'Hyménolobe pauciflore (dont c'est la seule station en région Rhône-Alpes) et le Sumac fustet ou "arbre à perruque" qui trouve ici sa limite septentrionale. - le lit élargi puis le delta en aval. De très nombreux types d'habitats naturels, herbacés à boisés, humides à très secs abritent ici une faune et une flore d'une grande richesse. Plus de deux cents espèces d'oiseaux ont été observées, qu'il s'agisse de migrants, d'hivernants ou de nicheurs comme le Goéland cendré, la Sterne pierregarin, la Mouette rieuse ou le petit Gravelot. S'y joignent ajoutent six cent cinquante espèces de champignons et huit cent cinquante de plantes, qui font de cet ensemble le site écologique départemental le plus riche proportionnellement à sa surface.

Milieux naturels

24.223	BROUSSAILLES DE SAULES ET DE MYRICAIRE GERMANIQUE
24.224	FOURRES ET BOIS DES BANCS DE GRAVIERS
31.8123	FRUCTICEES DE STATIONS ROCAILLEUSES A COTONEASTER ET AMELANCHIER
34.11	PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
41.13	HETRAIES NEUTROPHILES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
65	GROTTES

Flore

Capillaire de Montpellier	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
Vulpin fauve	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
Apéra interrompue	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus</i> L.
Berle dressée	<i>Berula erecta</i>
Calamagrostide des rivages	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller fil.) Koele
Laïche paradoxale	<i>Carex appropinquata</i> Schumacher
Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus</i> L.
Petite Centaurée élégante	<i>Centaurium pulchellum</i> (Swartz) Druce
Sumac fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Cyclamen d'Europe	<i>Cyclamen purpurascens</i> Miller
Souchet brun	<i>Cyperus fuscus</i> L.
Œillet arméria	<i>Dianthus armeria</i> L.
Cardère poilue	<i>Dipsacus pilosus</i> L.
Héléocharis épingle	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roemer & Schultes
Panicaud champêtre	<i>Eryngium campestre</i> L.
Cotonière spatulée	<i>Filago pyramidata</i> L.
Cotonière commune	<i>Filago vulgaris</i> Lam.
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis</i> Weston
Gentiane d'Allemagne	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel
Pesse vulgaire	<i>Hippuris vulgaris</i> L.
Impatiente ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Lathrée écailleuse	<i>Lathraea squamaria</i> L.
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
Agripaume cardiaque	<i>Leonurus cardiaca</i> L.
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Mélampyre à crêtes	<i>Melampyrum cristatum</i> L.
Minuartie rouge	<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill
Myricaire d'Allemagne (Tamarin d'Allemagne)	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.
Œnanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Pédiculaire des marais	<i>Pedicularis palustris</i> L.
Peucedan des montagnes	<i>Peucedanum oreoselinum</i>
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Gnaphale blanc jaunâtre	<i>Pseudognaphalium luteo-album</i> (L.) Hilliard & Burt
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Souchet jaunâtre	<i>Pycreus flavescens</i> (L.) Reichenb.
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum</i> L.
Cresson d'Islande	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunn.) Borbás
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Scrophulaire des ombrages	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Mammifères	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Oiseaux	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
Chevalier guignette	<i>Tringa hypoleucos</i>

Poissons	
Truite de lac	<i>Salmo trutta lacustris</i>
Omble chevalier	<i>Salvelinus alpinus</i>
Reptiles	
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Cordulégastre bidenté	<i>Cordulegaster bidentata</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>

Séneçon des Alpes	<i>Senecio alpinus (L.) Scop.</i>
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis (L.) Chevall.</i>
Spirodèle à plusieurs racines	<i>Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden</i>
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum L.</i>
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum L.</i>
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis R. Br.</i>
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor L.</i>
Molène pulvérulente	<i>Verbascum pulverulentum Vill.</i>
Zanichellie des marais	<i>Zannichellia palustris L.</i>

Bibliographie

APEGE

Plan de gestion de la réserve naturelle du Delta de la Dranse 1999-2003

62 p pages 1999 Consultable : ASTERS

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.



Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune



p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel


22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes





Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°74000059

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 2/2

N
Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)