



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74000071

Ancien N° régional : 74008000

Têtes des Suets

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 149,03 ha

Haute-Savoie SAMOENS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux suoérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 14

Description et intérêt du site

Les Têtes des Suets, situées dans le Faucigny, dominant Samoëns. Ce massif à exposition ensoleillée est essentiellement boisé. Il abrite ainsi de nombreuses espèces d'oiseaux nichant en forêt, ainsi que d'autres espèces animales remarquables. On rencontre ainsi la Grenouille rousse, essentiellement nocturne et très active par temps de pluie. Au printemps, les adultes se regroupent dans des mares pour procréer. Ils regagnent, ensuite, les bois environnants pour poursuivre leur vie. C'est dans ces mêmes bois qu'ils vont hiberner. On peut rencontrer cette grenouille manifestant une grande résistance au froid jusqu'à assez haute altitude. Les cônes des conifères étant la principale source de nourriture du Cassenoix moucheté, il n'est pas rare de voir et d'entendre cet oiseau, perché au sommet d'un épicéa et poussant son cri rauque, semblable au choc de deux pierres que l'on cogne l'une contre l'autre. Il se nourrit essentiellement des amandes des cônes de Pin cembro (ou Arolle). Toutes ne sont pas avalées : comme le geai, il enterre une partie de son butin en prévision de la disette hivernale. Il creuse alors des tunnels dans l'épaisse couche de neige pour accéder à ses cachettes. Certaines cachettes ne seront jamais retrouvées : il participe ainsi à la régénération du Pin cembro. L'Hirondelle des rochers, quant à elle, est présente dans les falaises et les gorges encaissées. On peut aussi citer d'autres espèces d'oiseaux remarquables telles que l'Aigle royal, la Bécasse des bois, le Faucon pèlerin ou le Grand-duc d'Europe.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Grenouille rousse *Rana temporaria*

Mammifères

Musaraigne alpine *Sorex alpinus*

Oiseaux

Martinet à ventre blanc *Apus melba*

Aigle royal *Aquila chrysaetos*

Gélinotte des bois *Bonasa bonasia*

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris*

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*

Pic tridactyle *Picoides tridactylus*

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BAL B., BRESSOUD B., THOMASSET F.

Stratégie commune de sauvegarde des milieux sensibles et des paysages. Espace Mont Blanc

71 p pages 2000 Consultable : ASTERS

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes


JORDAN R., JORDAN G.

Pic tridactyle (Picoides tridactylus) : donnée récente de nidification en Haute-Savoie (France)

p 85 pages 1999 Consultable : CORA Région




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE
RURALE



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74000071

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)