

ZNIEFF* de type I

N° régional : **74030003**

Ancien Nº régional: 74330000,98640000,74040001,74040002,74360000,74040004,74040005,74040003

Forêt de Planbois

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie ALLINGES, BALLAISON, BONS-EN-CHABLAIS, SCIEZ

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	3	Reptiles	3	Coléoptères	0
		Mammifères	3			Libellules	3
Végétaux suoérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	1
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	1	Papillons	3

Nombre de données d'observation collectées : 252

Légende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1862,03 ha

- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Description et intérêt du site

Ce massif forestier est situé dans le bassin lémanique entre le lac et les premiers reliefs préalpins. Reposant sur des terres argileuses d'origine glaciaire et parsemée de quelques blocs erratiques, sa topographie est plane mais cependant plus ou moins profondément entaillée par le réseau hydrographique, de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres pour le Foron qui draine la plupart des ruisseaux secondaires. Par son altitude modeste, comprise entre 470 et 530 m, mais installée au pied des reliefs, la forêt de Planbois est une forêt collinéenne qui compte cependant un fort pourcentage d'éléments faunistiques et botaniques montagnards, ne serait ce que dans ce qui est le plus visible, son fort enrésinement (épicéa, sapins), renforcé par la main de l'homme. Ailleurs, c'est la chênaie, la chênaie-charmaie et un boisement de Tremble qui occupent l'espace. Mais quelques clairières herbeuses d'origine humaine viennent s'ajouter à une couronne de prairies méso-hygrophiles (présentant des conditions d'humidité moyennes) fauchées ou pâturées et quelques zones marécageuses. A l'habitat forestier classique viennent se superposer des milieux de haute valeur écologique comme les prairies humides à Glaïeul des marais et les pinèdes sur argiles riches en orchidées. Située dans un contexte urbanistique en plein essor et qui plus est d'accès facile, cette forêt jouit d'une bonne connaissance de ses richesses écologiques. Cette forêt est très réputée pour sa diversité mycologique (plus de 2000 espèces) et botanique (500 à 600 espèces recensées) avec les plus belles stations départementales du très rare Glaïeul des marais et une grande richesse en orchidées incomparable, parmi lesquelles l'Epipactis violacé. La faune y est également très riche. On dénombre plus particulièrement le Castor d'Europe (réintroduit) et le crapaud Sonneur à ventre jaune, dont ce site présente le plus bel et vaste ensemble régional en terme de fréquence et d'abondance. On remarque encore la Bécasse, l'Engoulevent, le Loriot, le Bouvreuil, la Pie-grièche écorcheur et de nombreux rapaces (Bondrée, milans...), divers reptiles et amphibiens : tritons, Salamandre, Grenouille agile. Chez les invertébrés, on compte plusieurs espèces de lépidoptères de grand intérêt : Damier de la Succise, Erèbe ou Limenitis.

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Milieux naturels

37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES 37.31 x 42.5 PINEDES A MOLINIE SUR GLACIAIRE ARGILO-LIMONEUX

38.2 PRAIRIES DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE

Flore

Aigremoine odorante Agrimonia procera Wallr.

Berle dressée Berula erecta

Scirpe maritime var. Bolboschoenus maritimus var. maritimus

Laîche des rives Carex riparia Curtis

Petite Centaurée élégante Centaurium pulchellum (Swartz) Druce

Orchis jaune pâle Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex Boll.) Holub

Orchis de Traunsteiner Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó

Œillet superbe Dianthus superbus L. Epipactis de Müller Epipactis muelleri Godfery Epipactis violacé Epipactis purpurata Sm. Gaudinie fragile Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. Gentiane d'Allemagne Gentianella germanica (Willd.) Börner

Glaïeul des marais Gladiolus palustris Gaudin Orchis musc Herminium monorchis (L.) R. Br.

Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d'eau Millepertuis élégant Hypericum pulchrum L. Impatiente ne-me-touchez-pas Impatiens noli-tangere L. Laser de Prusse Laserpitium prutenicum L. Lathrée écailleuse Lathraea squamaria L. Gesse noircissante Lathyrus niger (L.) Bernh. Liparis de Loesel Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard

Mélampyre à crêtes Melampyrum cristatum L. Myosotis versicolore Myosotis discolor Pers. Ophioglosse commun (Langue de Ophioglossum vulgatum L.

Ophrys abeille Ophrys apifera Hudson

Ophrys araignée Ophrys sphegodes subsp. sphegodes Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum (L.) Roth Potamot plantain Potamogeton coloratus Hornem.

Groseiller rouge Ribes rubrum L. Rosier à styles soudés Rosa stylosa Desv. Saule rampant Salix repens L.

Scirpe mucrone Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla

Scorzonère peu élevée Scorzonera humilis L. Senecio aquaticus Hill Sénecon aquatique Silaum silaus

Cumin des prés (Fenouil des

serpent)

chevaux)

Fougère des marais Thelypteris palustris Schott Trèfle beige Trifolium ochroleucon Hudson

Petite Utriculaire Utricularia minor L. Véronique à écussons Veronica scutellata L.

Violette des montagnes Viola canina subsp. ruppii (All.) Schübl. & Martens

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Grenouille rousse Rana temporaria Triton alpestre Triturus alpestris Triton palmé Triturus helveticus

Mammifères

Castor d'Europe Castor fiber Cerf élaphe Cervus elaphus Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Reptiles

Lézard des souches Lacerta agilis

Faune invertébrée

Libellules

Leste dryade Lestes dryas

Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata

Papillons

Damier de la Succise Euphydryas aurinia

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 p pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes **Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie** Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 p pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série $n^\circ 1$

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

LAFRANCHIS J.

Le Damier de la Succise

p 13 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22~p~pages~~2003~Consultable:~DIREN Rhône-Alpes





